



Cephalosporins 頭孢菌素類

抗生素藥物使用須知

學名	商品名	中文名	劑量	藥品外觀	藥號
Cephalexin	Cephalexin	信保欣膠囊	250mg		21K014
Cefaclor	Cero	賜福膠囊	250mg		21K022
Cefuroxime Axetil	Ceflour	喜華膜衣錠	250mg		21C068
Cefixime	Cefixmycin	喜復黴素膠囊	100mg		21C050

◎ 作用

治療具感受性細菌所引起之相關性感染症。

◎ 用法

因個人狀況不同，故所需服用之劑量與頻次亦有所差異，請遵照醫師處方之劑量及服法使用，未經醫師指示，切勿自行驟然更改劑量或停藥。

◎ 注意事項

1. 即使病人已自覺症狀改善，在未經醫師指示或同意前絕不可私自停藥。
2. 服藥前若有下述狀況時請先告知醫師：
懷孕或授乳期之婦女、曾對青黴素或頭孢菌類抗菌劑過敏、正在服用避孕藥或probenecid（排尿酸劑）。
3. 請主動告知醫師您現正使用的藥物，包括成藥、維他命、中草藥、制酸劑或抗菌劑；在您計劃服用任何其他藥物（包括市售成藥）前，請先諮詢您的醫師或藥師。
4. 若您服藥後出現嚴重腹瀉，在服用止瀉劑前請先主動告知醫師您現正使用頭孢菌素，並與其商討相關之治療。
5. 服用cefixime（喜復黴素）後可能會讓您感覺頭昏或嗜睡，故請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。

◎ 相關副作用的處理方式

1. 若您於服藥期間發生下述狀況時請立即回診就醫：
皮膚疹；臉部、咽喉或口唇腫脹；呼吸困難；嚴重腹瀉（水瀉或合併有血絲）；嚴重胃痛或嘔吐；皮膚發熱或脫屑。
2. 若您於服藥期間發生下述狀況時請告知您的醫師：
輕微腹瀉、噁心、口唇疼痛、陰道搔癢或有異常分泌物、關節疼痛。

◎ 忘記服藥之處置

若您發現忘記服藥，則請盡快補服。倘若已接近下次的服藥時間，則請待下次正確之服藥時間再服藥。請注意：切勿在同一時間內重複服用兩次劑量。

◎ 藥品儲存處置

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月，但請勿未經醫師指示自行服用此類藥物。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。
4. 不可將本藥與他人分享，以免發生危險。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

