

醫療財團法人

# Morphine 使用須知

學名	中文名	商品名	劑量	藥品外觀	藥號
Morphine Sulfate	硫酸嗎啡錠	Morphine	15mg		22M058
	默痛舒持續性藥效膠囊	MXL	60mg	<p>(整粒膠囊吞服) (或是打開膠囊，但不可壓碎或嚼碎膠囊及其小顆粒)</p>	22M040
	嗎啡長效膜衣錠	MST	30mg		22M008

## ◎ 作用

重度疼痛之緩解。

## ◎ 用法

請遵照醫師處方之用法及劑量服用，未經醫師同意，切勿自行增加藥量或服藥次數。

## ◎ 注意事項

1. 若有嗎啡過敏、肝功能障礙、呼吸抑制、氣喘、心臟衰竭、心律不整、頭部損傷者、腦部有腫瘤者、急性酒精中毒者、痙攣、同時使用MAO抑制劑者等，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
2. 本藥具成癮性，應謹慎使用。
3. 連續使用後突然停藥或同時使用麻醉藥品拮抗劑將會發生戒斷症狀，如流淚、冒冷汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散腫、頭痛、失眠、不安、譫妄、震顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等。
4. 發現有麻痺性腸阻塞可能性時，不應該使用本品。
5. 服藥後可能會讓您感覺嗜睡，在尚未確認您對這類藥物的反應前，請盡量避免從事需全神貫注或可能造成危險之相關活動，如開車、操作機械等。
6. 此藥物使用於懷孕婦女其安全性尚未確立，若妳計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。

## ◎ 相關副作用

呼吸抑制、噁心、嘔吐、顏面潮紅、心悸、膽道痙攣、便秘、失眠、頭痛、幻覺、排尿障礙、皮膚搔癢、蕁麻疹等。

## ◎ 忘記服藥時之處置

若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。

## ◎ 藥品儲存處置

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

## ◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：[http://www.chimei.org.tw/main/cmh\\_department/55500/drugsearch.htm](http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm)

