

抗微生物製劑使用注意事項

103.07.01

藥號	商品名	學名	注意事項
11A023	Ambisome	Amphotericin B Liposom	核對用法: IV 滴 >2hr.
			以 D5W 配製,6 小時內使用
			配製後 2~8 度,保存 24 小時
			脂黴素微脂粒凍晶
			若未配製可室溫保存
11A118	Augmentin	Amoxil+Clavunate	20ml 注射用水配製(最終 20.9ml);
			配製溶液請於 20 分鐘內使用.
			配製後呈現無色或淡粉紅色
			20ml 注射用水配製後
			1)可 IV 推 3~4 mins.
			2)加入 100ml 輸液,IV 滴 30~40min
			點滴液 25°C可存 4hrs,5°C存 8hrs.
11A142	Eraxis	Anidulafungin	核對用法: IV 滴
			每 100mg 以 30ml D.W.調配後
			以 100ml D5W 或 N.S.稀釋 .
			建議輸注<80ml/hr
			配製後,冷藏保存 24 小時
			稀釋後,室溫保存 48 小時
			需冷藏
11A150	Amikin	Amikacin	核對用法: IM,IV 滴
			IV 滴 inD5W,NS,LR: 2.5-5mg/ml.
			原瓶開封後,室溫 25°C以下,
			或 2-8°C可保存 24 小時.
			IV 滴稀釋液 25°C下可保存 24 小時
			變色或沉澱即丟棄
11B062	Baktar	SMX +TMP	核對用法: IV 滴約 90 分.
			以 NS 配製 . IV 滴約 90 分 .
			以 NS 配製 . 每 ample 至少稀釋
			於 125ml . 並於六小時內用完 .
11C027	Cleocin	Clindamycin	核對用法: IM,IV 滴.
			IV 滴濃度勿超過 12mg/ml.
			IV 滴速率勿超過 30mg/min.
			Max. 1200mg/hr
11C085	Cefazolin	Cefazolin	核對用法: IM, IV 推, IV 滴 .

			以 2.5ml 注射用水配製(330mg/ml)
			1)可 IM.
			2)再加入 5ml 注射用水稀釋,
			(濃度 125mg/ml)可 IV 推 >3~5 分.
			3)加入 50-100ml 輸注液中可 IV 滴.
			4)25°C可放 24hr,2-8°C可放 96hr
11C120	Cetazine	CeftaZidime	核對用法: IM, IV 推, IV 滴。
			以注射用水配製後,
			25°C可放 12hr,2-8°C可放 3 天.
			3ml 注射用水配製(250mg/ml)可 IM
			10ml 注射用水配製(濃度 90mg/ml)
			1)可 IV 推.
			2)加入 50ml 輸液(成 20mg/ml)IV 滴
11C170	Ceftriaxone	Ceftriaxone	核對用法: IM, IV 推, IV 滴。
			1)以 10ml 無菌注射用水配製後,
			25°C可保存 6hr,
			2-8°C可保存 24hr.
			IV 推>2- 4 分鐘,或 IV 滴>30 分鐘
			3)本藥品不可加入含鈣之溶液中.
11C207	Cefrom	Cefpirome	核對用法: IV 推, IV 滴.
			以 10ml 注射用水配製後,
			冷藏 2-8°C可保存 24hr.
11C215	Cancidas	Caspofungin	核對用法: IV 滴.
			原瓶請冷藏 2-8°C保存.
			以 10.5ml 無菌注射用水或 0.9%NS
			配製(濃度 5mg/ml)後,
			加入相容點滴,IV 滴 60 分鐘.
			配製溶液於 25°C以下可放 24hr.
			稀釋後點滴液於 25°C以下
			可放 24hr; 2-8°C可放 48hr.
11C223	Colimycin	Colistin	核對用法: IV 推.IV 滴
11C231	Ciproxin	Ciprofloxacin	核對用法: IV 滴。
			可直接靜脈輸注,
			或與相容輸液混合輸注>60 分鐘;
			藥瓶請於使用前才從紙盒中取出
			請注意:包裝含量為 200mg/100ml

			單獨一條輸注管路,以避免藥品產生結晶
11D135	Finibax	Doripenem	先以 10ml D.W.或 N.S.泡製,
			再用 100ml N.S.或 D5W 稀釋。
			IV 滴>1 小時。
			以 N.S.稀釋,室溫可保存 12 小時,
			以 D5W 稀釋,室溫可保存 4 小時, 稀釋液冷藏可保存 24 小時。
11E013	Erythrocin	Erythromycin	核對用法: IV 滴.
			以 10ml 注射用水配製後,
			室溫可保存 24hr. 冷藏 2-8°C可保存 14 天.
11E021	Invanz	Ertapenem	核對用法: IM, IV 滴。
			1)10ml 注射用水或 N/S 配製後,
			移入 50ml0.9%NaCl,IV 滴>30 分鐘.
			未使用之靜脈輸注液,
			5°C可保存 24hr.25°C可保存 6hrs,
			2)3.5mL 1%或 2%lidocaine 注射液 配製後,須於 1 小時內使用. 可深部肌肉注射.
11F028	Fungizon	Amphotericin-B	核對用法: IV 滴.
			原瓶冷藏 2-8°C避光保存。
			限用 dextrose 點滴稀釋 (濃度 0.1mg/ml)IV 滴 2~6hr 。
			以 10ml 注射用水配製後
			(濃度 5mg/ml)25°C可放 24hr, 冷藏 2-8°C可保存 7 天.
11F139	Flumarin	Flomoxef	核對用法: IV 推、IV 滴。
			以 4ml 以上注射用水,D5W,N/S 配製 配製溶液室溫可存放 6hr, 冷藏 2-8°C可保存 24hr.
11F147	Fluconazole	Fluconazole	核對用法: IV 滴。
			輸注速率< = 200 mg/hr 未用完之殘液請丟棄.
			請注意:包裝含量為 200mg/100ml
11F155	UfO	Fosfomycin	核對用法: IV 推, IV 滴。
			20ml 注射用水或葡萄糖注射

			液配製後,IV 推>5 分鐘, 或
			加入 100-500ml 相容點滴中
			IV 滴 1- 2hr.
			請注意劑量,4g/vial
11G041	Cymevene	Ganciclovir	核對用法: IV 滴。
			用 10ml 注射用水配製後,
			再以 NS,D5W 或 LR 稀釋
			(濃度勿大於 10mg/ml)IV 滴 > 1hr.
			配製後勿冷藏,室溫可保存 12hr.
11G059	Gentamicin	Gentamicin	核對用法: IV 滴。
			IM;或以 50-200ml5%G/W,0.9%NaCl
			稀釋後 IV 滴.
			變色或沉澱立即丟棄
11L046	Zyvox	Linezolid	核對用法: IV 滴 30-120min
11L054	Cravit	Levofloxacin	核對用法: IV 滴
			250mgIV 滴至少 30 分鐘,
			500mgIV 滴至少 60 分鐘.
			移除外盒後之原瓶於室內照明下
			可保存 3 天.
			原瓶開封後請於 3 小時之內使用.
11M027	Mepem	Meropenem	核對用法: IV 滴 > 30mins.
			以 100ml 以上 N/S 配製後,
			冷藏 2-5°C可保存 24hrs.
			室溫下可存放 6hr.
11M069	Avelox	Moxifloxacin	核對用法: IV 滴 1 hr.
			開封後室溫可存放 24hr.
			請勿冷藏.
11M093	Mycamine	Micafungin	核對用法:IV 滴 1 小時以上.
			每 50mg 藥瓶用 5ml 0.9%NS
			或 5%G/W 配製(濃度 10mg/ml),
			之後再加入 100ml 0.9%NS
			或 5%G/W 稀釋,IV 滴 1 小時以上.
			配製溶液於 25°C以下可保存 24hr.
			稀釋的輸液需避光,於 25°C以下
			可保存 24hr.
11P060	Ampolin	Ampicillin	核對用法: IM, IV 推, IV 滴.

			1.8ml 注射用水配製後可 IM. 5ml 注射用水配製後可 IV. 配製後 1 小時內使用, 未用完藥液請丟棄.
11P078	Tazocin	Tazobactam/Piperacilin	核對用法: IV 滴 > 30 分. 禁與 Lactated Ringers 混合。 以 10mlN/S,D5W,注射用水配製後, 冷藏 2-8°C可保存 48hr. 室溫可存放 24hr.
11P086	Pitamyacin	Piperacillin	核對用法: IM, IV 推, IV 滴. 以至少 4ml 注射用水配製後 ,可 IM 以至少 10mlIM 注射用水配製後, 1)可 IV 推 3~5mins 2)再稀釋到至少 50mlIV 滴 20-40 分 配製溶液室溫可存放 24hr. 冷藏 2-8°C可保存 48hr.
11P105	Prostaphlin	Oxacillin	核對用法: IM, IV 推, IV 滴. 以 2.7ml 注射用水配製 (濃度 250mg/1.5ml)後,可 IM. 以 5mlN/S,注射用水配製,可 IV 推. 以 5mlN/S,注射用水配製後,加入 點滴稀釋成 0.5-2mg/ml,可 IV 滴. 配製後,室溫可存放 3 天 ,2-8°C可存放 7 天
11P171	Penicillin G	Penicillin G	核對用法: IM, IV 推, IV 滴。 依下述方式以 D5W,N/S 或注射用水 配製後,2-8°C可保存 7 天。 加入 1.9ml 溶解-濃度 100 萬 U/ml; 加入 4.9ml 溶解-濃度 50 萬 U/ml; 加入 10.9ml 溶解-濃度 25 萬 U/ml; 加入 13.9ml 溶解-濃度 20 萬 U/ml.
11P224	Rapiacta	Peramivir	成人: 300 mg IVD 15 分鐘以上 小兒:10 mg/kgIVD 15 分鐘以上 心臟循環器官功能不良者; 腎功能不良者可能使症狀惡化。
11S011	SABS	Metronidazole	核對用法: IV 滴.

			開封後室溫可存放 2-3 天.
11S045	Streptomycin	Streptomycin	核對用法: IM.
			以 NS,注射用水配製
			最終濃度在 250mg/ml 以下
			配製後於室溫避光可儲存 7 天.
11S053	Sulbactam	Sulbactam	1)核對用法: IV 推,IV 滴.
			2)以 2ml 注射用水或 NS 配製後可 IM
			3)以至少 2ml 注射用水或 NS 配製後 可 IV
			4)配製溶液室溫可存放 24hr.
11S061	Streptomycin	Streptomycin	核對用法: IM.
			以 NS,注射用水配製
			最終濃度在 250mg/ml 以下
			配製後於室溫避光可儲存 7 天.
11T034	Targocid	Teicoplanin	核對用法: IM,IV 推,IV 滴(30 分).
			以包裝所附 3ml 注射用水配製
			(濃度 200mg/3ml)後,
			冷藏 2-8°C可保存 24hr.
11T076	Tienam	Imipenem+cilastatin	核對用法: IV 滴.
			1)劑量 ≤ 500mg,IV 滴 > 20-30mins;
			劑量 > 500mg,IV 滴 > 40-60mins.
			2)請依仿單建議方式配製.
			3)配製溶液(濃度 5mgimipenam/ml 2-8°C可放 24hrs.室溫可放 4hrs.
11T092	Tygacil	Tigecycline	核對用法: IV 滴.
			以 5.3ml N/S 或 D5W 配製
			(濃度 10mg/ml)後,立即加入 100ml N/S 或 D5W 輸注液 IV 滴 30-60 分.
			最大靜脈輸注液濃度為 1mg/ml.
			稀釋後之 100ml 靜脈輸注液,
			25°C可放 6hrs,2-8°C可放 24hrs.
11V020	Vancocin	Vancomycin	核對用法: IV 滴.
			每 500mg 以 10ml 注射用水配製後,
			溶於 100mlNaCl 或 D5W,IV 滴 > 60 分
			每 500mg 以 10ml 注射用水配製後, 冷藏 2-8°C可保存 14 天.

11V088	Vfend	Voriconazole	核對用法: IV 滴 1- 2hr.
			給藥速率不可超過 3mg/kg/小時.
			以 19ml 注射用水配製
			(最終體積 20ml; 濃度 10mg/ml).
			配製溶液冷藏 2-8°C可存放 24hr.
11Z010	Zinacef	Cefuroxime	核對用法: IM,IV 推,IV 滴.
			以 3ml 注射用水配製後可 IM
			以至少 6ml 注射用水配製後可 IV
			以注射用水配製之溶液
			2-8°C可放 48hr.室溫可放 24hr.
11Z028	Zovirax	Acyclovir	核對用法:IV 滴>1hr,濃度<5mg/ml
			以 10ml 注射用水或 N/S 配製(濃度
			25mg/ml)後,未用完藥液請丟棄。
			配製後加入 0.9%NaCl 或 0.45%NaCl
			(濃度<5mg/ml)室溫可保存 12hr.
配製後勿冷藏			