

公 告

新進藥品

編號：1040805

藥品英文名	Morphine		
藥品中文名	"管制藥品廠"硫酸嗎啡錠 15 毫克		
主成分名	Morphine Sulfate 15mg		
藥品代碼	22M058	廠牌／代理商	衛生福利部食品藥物管理署管制 藥品製藥工廠
衛生署 核准適應症	重度疼痛之緩解		
用法用量	一般成人劑量：每 4 小時視疼痛情況口服給藥 5~30 毫克。劑量可因病患個別差異在醫師處方下調整。某些癌末嚴重慢性疼痛病患，應每 4 小時定時給予可達足夠止痛效果之最低劑量。由於嗎啡具呼吸抑制作用，年長者、重病者及有呼吸道問題之病患應減量給藥。		
可能的副作用	呼吸抑制，有少部分病患會發生循環系統抑制、呼吸停止、休克及心跳停止。其他副作用包括：噁心、嘔吐、視力調節障礙、顏面潮紅、心悸、膽道痙攣、便秘、失眠、頭痛、幻覺、精神混亂、欣快感、排尿障礙、皮膚搔癢、蕁麻疹。		
用藥注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 禁忌：對嗎啡過敏、嚴重肝功能障礙、嚴重呼吸抑制者、嚴重中樞神經抑制者、氣喘、慢性肺部疾患繼發心臟衰竭、心律不整、顱內壓升高者、頭部損傷者、腦部有腫瘤者、急性酒精中毒者、痙攣狀態者、膽管術後、同時使用 MAO 抑制劑者。2. 本藥具成癮性，有藥物依賴之往歷者，應慎重使用。嗎啡會造成耐受性、心理及生理依賴性，連續使用後突然停藥或同時使用麻醉藥品拮抗劑將會發生成癮症狀，如流淚、冒冷汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散腫、頭痛、失眠、不安、譫妄、震顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等。嗎啡亦會與中樞神經抑制劑產生交互作用，因此對於同時服用其他麻醉性止痛劑、全身性麻醉劑、Phenothiazines、其他安神劑、安眠鎮靜劑、三環抗抑鬱劑及其他中樞神經抑制劑（包括酒精）。呼吸抑制、低血壓及明顯的鎮靜作用或昏迷都可能發生。3. 一般而言，嗎啡之作用可被鹼性化藥劑加強，被酸性化藥劑拮抗，其止痛效果可被 chlorpromazine 及 methocarbamol 加強。中樞神經抑制劑如吸入性麻醉劑、安眠劑、巴比妥類、phenothiazines、chloral hydrate、glutethimide、鎮靜劑、MAO 抑制劑（包括 procarbazine）、抗組織胺、交感神經乙型阻斷劑、酒精、furazolidone、coumarins 系抗凝血劑及其他麻醉藥品會增強嗎啡之抑制作用。		

嗎啡鹽酸錠，藥物建議轉換方式（疼痛科建議）：

舊劑型 Morphine 10mg	劑量	新劑型 morphine 15MG	劑量
Morphine(10)1# q8h po	30mg/Day	Morphine(15)0.5# q6h po	30mg/Day
Morphine(10)1# q6h po	40 mg/Day	Morphine(15)1# q8h po	45mg/Day
Morphine(10)1.5# q6h po 或 Morphine(10)1# q4h po	60mg/Day	Morphine(15)1# q6h po	60mg/Day
Morphine(10)1.5# q4h po	90mg/Day	Morphine(15)1# q4h po	90mg/Day

備註：

- 1.此藥物劑量結果以換算日總劑量，但實際臨床藥物效果待依病人使用後得知效用
- 2.服用嗎啡鹽酸錠，仍須考量其藥理有效時間(4-8 小時，不超過 8 小時為建議給藥頻次)

特殊使用注意事項

藥品圖樣

