

公 告

編號：1070914

品項代號 17T058 TAITA NO.5 INJECTION "OTSUKA" "大塚"台大五號注射液變更包裝，說明如下，謝謝!!

藥品英文名	TAITA NO.5 INJECTION "OTSUKA"	
藥品中文名	"大塚"台大五號注射液	
主成分名	Sodium chloride 0.82 mg/ml Potassium acetate 0.59 mg/ml Sodium acetate 1.8 mg/ml Magnesium chloride hexahydrate 0.3 mg/ml Dextrose anhydrous 100 mg/ml Potassium phosphate monobasic(=Potassium biphosphate) 1.63 mg/ml	
廠牌 / 代理商	大塚	
衛生署核准適應症	手術前後及未能進食病人之水份、電解質、熱能補充、維持液	
藥品圖樣	舊藥	新藥
		

藥劑部藥管組 107.9.28

公 告

編號：1070915

新進藥品

藥品英文名	Rizatan		
藥品中文名	羅莎疼錠		
主成分名	Rizatriptan 5mg		
藥品代碼	23R085	廠牌 / 代理商	保瑞/聯邦
衛生署 核准適應症	成人及 6 至 17 歲兒童有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解。		
用法用量	成人的建議起始劑量為 5 毫克或 10 毫克。追加劑量：需至少間隔 2 小時再追加劑量：24 小時內不宜超過 30 毫克。 6 至 17 歲兒童的建議用量乃依據體重調整劑量。小於 40 公斤之兒童的建議劑量為 5 毫克。大於或等於 40 公斤之兒童的建議劑量為 10 毫克。		
可能的副作用	胸痛，潮紅，心悸，頭暈，嗜睡，疲勞。		
用藥注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 同時使用 propranolol 會使 Rizatriptan 之血中濃度升高2. 對於正在使用 propranolol 的大於或等於 40 公斤兒童，建議使用單一劑量 5 毫克 (即 24 小時內的最大劑量為 5 毫克)。小於 40 公斤之兒童若正在使用 propranolol，則不能使用本藥品。3. 對於冠狀動脈疾病已確立的患者，不可服用 Rizatriptan。其它 5-HT_{1B/1D} 作用劑 (如 sumatriptan) 不可與 Rizatriptan 同時併用。4. 投與麥角胺 (ergotamine) 類之製劑 (如 ergotamine, dihydro-ergotamine 或 methysergide) 之後六小時內，不建議服用 Rizatriptan，反之亦然。5. 血清素症候群可能發生在 triptans 類藥物，這類藥物包括 rizatriptan，特別是在併用選擇性血清素再吸收抑制劑 (SSRI)、血清素正腎上腺素再吸收抑制劑 (SNRI)、三環抗憂鬱製劑 (TCA)、以及單胺氧化酶抑制劑 (MAOI)。6. 在小於 6 歲兒童的安全性與有效性尚未建立。7. 過量時可能會發生高血壓或其它更嚴重的心血管症狀。如果懷疑病患 Rizatriptan 過量時，可採清腸胃的方法 (如洗胃後再投與活性碳)。即使臨床症狀已消失，應至少須再持續 12 小時的臨床和心電圖監測。		
特殊使用注意事項	服藥後可能嗜眠,故開車或從事機械操作時需特別小心		

藥品圖樣



藥劑部藥管組 107.9.28