

新進藥品

藥品英文名	Pergoveris		
藥品中文名	倍孕力注射筆 450/225 國際單位/ 0.72 毫升		
主成分名	450 國際單位 (相當於 33 微克) Follitropin alfa(r-hFSH) +225 國際單位 (相當於 9 微克) Lutropin alfa (r-hLH)/ 0.72ml		
藥品代碼	17P010	廠牌 / 代理商	Merck
衛生署核准適應症	使用於黃體刺激激素(LH)與濾泡刺激激素(FSH)嚴重缺乏的婦女，以刺激濾泡發育。		
用法用量	建議劑量以每天注射 Pergoveris (含濾泡刺激激素 150 國際單位/ 黃體刺激激素 75 國際單位) 開始。開始治療 7~14 天後才逐漸增加劑量，視情況每次增加 37.5 IU 至 75 IU 經核准的 Follitropin alfa (濾泡刺激激素)，每一治療週期視臨床狀況最多可延長至五個星期。		
可能的副作用	頭痛，腹痛，疲勞，卵巢囊腫，噁心		
用藥注意事項	1. Pergoveris 以皮下注射給予 2. Pergoveris 禁用於下列情況：下視丘和腦下垂體腫瘤、原因不明及非多囊性卵巢症所引起之卵巢囊腫或卵巢增大者、原因不明的婦科出血、卵巢、子宮或乳房癌 3. 不可使用於授乳婦女 4. 從化學和物理的觀點來看，本品在使用中的安定性，可於25°C 下維持28 天。 5. 一旦打開使用後，藥品可在25°C 下存放最長達28 天。		
藥品圖樣			

公 告

新進藥品

編號：1081004

藥品英文名	Labixten		
藥品中文名	必利停錠		
主成分名	Bilastine 20mg		
藥品代碼	23B017	廠牌 / 代理商	Menarini
衛生署核准適應症	緩解成人及 12 歲(含)以上兒童過敏性鼻炎(季節性和常年性)及慢性蕁麻疹的症狀。		
用法用量	成人和青少年 (十二歲 (含) 以上) : 每日一錠 20mg bilastine 能緩解過敏性鼻炎 (季節性和常年性) 和蕁麻疹症狀。		
可能的副作用	嗜睡，頭痛，頭暈，上腹部疼痛		
用藥注意事項	1. 食物會明顯降低口服 bilastine 的生體可用率達 30%。建議空腹服用 2. 沒有 bilastine 使用於治療 0~2 歲兒童過敏性鼻炎及蕁麻疹的經驗。使用於年紀小於 12 歲以下兒童的安全性和有效性資料尚未建立。		
健保給付規定	健保無給付，此藥品需自費。		
藥品圖樣			

藥劑部藥管組 108.10.16

新進藥品

藥品英文名	Femoston		
藥品中文名	芬嗎通膜衣錠		
主成分名	1 mg 17 β -estradiol (as hemihydrate)+ 5 mg dydrogesterone		
藥品代碼	27F057	廠牌 / 代理商	Abbott
衛生署 核准適應症	荷爾蒙替代療法，治療停經至少 12 個月的婦女雌激素缺乏症狀。預防骨質疏鬆發生於停經後婦女具有骨折風險而無法耐受或禁用其他已核准用來預防骨質疏鬆的藥品。		
用法用量	每日服用不可間斷。每日一錠，每28 天為一個療程。 Femoston 1/5 應持續服用，療程之間不可間斷。		
可能的副作用	頭痛，腹痛，乏力，卵巢囊腫，噁心		
用藥注意事項	1. 禁忌症 • 已知或曾患有或疑似患有乳癌 • 已知或疑似雌激素依賴型惡性腫瘤(例如子宮內膜癌) • 已知或疑似黃體激素依賴型癌症(例如腦膜瘤) • 不明的生殖器出血 • 未治療的子宮內膜增生 • 曾發生或現有靜脈血栓栓塞(深部靜脈血栓，肺栓塞) • 已知的血栓好發症(例如protein C，protein S 或抗凝血酶缺乏，見警語及注意事項) • 活動性或最近有動脈血栓栓塞疾病(例如狹心症，心肌梗塞) • 急性肝疾病，或有肝病病史，只要肝功能檢查結果未回復正常 • 紫質症 2. 懷孕期間不可使用 Femoston。若使用 Femoston 治療期間懷孕了，應立即停藥。		
健保給付規定	健保無給付，此藥品需自費。		
藥品圖樣			

公 告

新進藥品

編號：1081006

藥品英文名	Divigel		
藥品中文名	迪維舒凝膠		
主成分名	Estradiol Hemihydrate 1mg/pk		
藥品代碼	37E043	廠牌 / 代理商	健喬信元
衛生署 核准適應症	女性由於自然停經或手術引起之女性荷爾蒙缺乏症狀的荷爾蒙替代療法-更年期的熱潮紅或生理不適、無法分泌女性荷爾蒙而引起的各種不適。		
用法用量	可以持續性或週期性方式給予。劑量可因個別需求投與每天0.5 克至1.5 克，相當於每天0.5 毫克至1.5 毫克Estradiol。其起始劑量通常從每天1.0毫克之Estradiol (即1.0 g之凝膠) 開始，在2至3個週期之後再調整劑量。		
可能的副作用	乳房脹痛、頭痛、水腫、噁心、嘔吐、偏頭痛		
用藥注意事項	1. 迪維舒凝膠每日使用一次，使用時將凝膠塗在下軀幹表皮或交替塗在左右大腿內側。其塗抹面積約為手掌之一至二倍。 2. 迪維舒凝膠不應塗抹於乳房、臉上及較敏感之皮膚上。塗抹之後應等待數分鐘讓凝膠變乾，一小時內不宜以清水沖洗。 3. 凝膠應避免意外接觸到眼睛，塗抹後應即刻洗手。 4. 若病人忘記使用，應儘可能於想起後趕快塗抹，若已超過12 小時，就跳過該次而改從下一次投藥時間使用，忘記塗抹可能會導致突破性出血。		
藥品圖樣	 更新日期:2019.10.15		