

藥劑簡訊

編號：1090707

藥號 21R235 Rifapentine(150mg)錠(公費)，因疾管署庫存不足，無法穩定提供藥物，因此院內剩餘庫存用完即鎖檔。

藥劑部藥管組 109.7.24

公 告

新進藥品

編號：1090708

藥品英文名	Dupixent											
藥品中文名	杜避炎注射劑											
主成分名	Dupilumab 300mg											
藥品代碼	19D001	廠牌 / 代理商	賽諾菲									
衛生署 核准適應症	<p>1. 異位性皮膚炎：可用於治療 12 歲(含)以上患有中度至重度異位性皮膚炎且對局部處方治療控制不佳或不適合使用該療法的病人。可併用或不併用局部皮質類固醇治療。</p> <p>2. 氣喘：可作為 12 歲(含)以上患有嗜酸性白血球表現型或口服皮質類固醇依賴型之重度氣喘病人的附加維持治療(add-on maintenance therapy)。使用限制：不適用於緩解急性支氣管痙攣或重積性氣喘(status asthmaticus)。</p>											
用法用量	<p>1. 異位性皮膚炎：</p> <p>成人劑量：建議劑量為一劑起始劑量 600 毫克 (300 毫克注射兩劑)，接著以 300 毫克隔週(every other week)注射一次。</p> <p>青少年劑量：於 12-17 歲病人的建議劑量詳見下表。</p> <table border="1"><thead><tr><th>體重</th><th>起始劑量</th><th>後續劑量 (隔週給藥)</th></tr></thead><tbody><tr><td><60 公斤</td><td>400 毫克</td><td>200 毫克</td></tr><tr><td>>60 公斤</td><td>600 毫克 (300 毫克注射兩劑)</td><td>300 毫克</td></tr></tbody></table> <p>Dupixent 可併用或不併用局部皮質類固醇治療。亦可併用局部鈣調神經磷酸酶抑制劑 (topical calcineurin inhibitors)，但應限用於臉部、頸部、腹股溝及會陰部等特殊患部。</p> <p>2. 氣喘：</p> <p>Dupixent 於成人及青少年(12 歲及以上)建議劑量：口服皮質類固醇依賴型之氣喘病人，或重度氣喘合併中度至重度異位性皮膚炎病人，建議 Dupixent 的起始劑量為 600 毫克，接著以 300 毫克隔周注射一次 其他病人建議起始劑量為 400 毫克，接著以 200 毫克隔周注射一次</p>			體重	起始劑量	後續劑量 (隔週給藥)	<60 公斤	400 毫克	200 毫克	>60 公斤	600 毫克 (300 毫克注射兩劑)	300 毫克
體重	起始劑量	後續劑量 (隔週給藥)										
<60 公斤	400 毫克	200 毫克										
>60 公斤	600 毫克 (300 毫克注射兩劑)	300 毫克										

<p>注意事項</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以皮下注射給藥 2. 皮下注射於大腿或腹部，不得注射於肚臍周圍 2 吋(5 公分)以內的範圍。若由照護者為患者注射，亦可注射於上臂。 3. 每次注射都應更換注射部位。不可注射於皮膚有壓痛、受傷、瘀青或結疤處。 4. 注射前先將 Dupilumab 預填注射器從冰箱取出，不要拔除針蓋使之回溫至室溫(45 分鐘)。 5. 注射前應以肉眼檢查是否出現顆粒及變色。Dupilumab 為澄清至淡乳白色，無色至淡黃色的溶液。若液體內有肉眼可見之顆粒、變色或呈現混濁則不得使用。 6. 若忘記注射給藥，應在 7 天內補注射，之後按原有時程給藥；若超過 7 天則不須補打，依照下次正常給藥時間再注射。 7. 接受 Dupixent 治療的患者應避免接種活菌疫苗。 8. Dupixent 無菌且不含防腐劑。任何未使用的部分應丟棄。 9. 應置放在原有紙盒並儲存於冰箱 2°C- 8°C 以避免光照。 10. 預填注射器可置於室溫下不超過 25°C 最多達 14 天。不可儲存高於 25°C。從冰箱取出後，必須在 14 天內使用，否則應予以丟棄。
<p>可能的副作用</p>	<p>注射部位反應、結膜炎、眼瞼炎、口腔疱疹、角膜炎、眼睛癢、其他單純疱疹、乾眼症。</p>
<p>藥品圖樣</p>	

公 告

新進藥品

編號：1090709

藥品英文名	Ikervis		
藥品中文名	宜可利 1 毫克/1 毫升眼用乳劑		
主成分名	Ciclosporin (1mg/1mL,0.3mL/A)		
藥品代碼	39C291	廠牌 / 代理商	台灣參天製藥
衛生署 核准適應症	治療嚴重乾性眼角結膜炎(Schirmer test without anesthesia < 5mm/5min)併角結膜上皮病變患者之發炎反應，但在目前使用局部抗發炎藥物或使用淚點塞病患未見療效者。 治療 4 歲以上兒童至 18 歲青少年之嚴重春季型角膜結膜炎(VKC)。		
用法用量	眼部使用。 治療嚴重乾性眼角結膜炎併角結膜上皮病變患者使用劑量 成人：建議劑量為 IKERVIS 一滴，每日一次，就寢時使用於患眼。應至少每 6 個月再評估一次治療反應。若忘記某次劑量，應依據平常方式於隔日繼續治療。應告知患者勿於患眼使用超過一滴眼用乳劑。 治療嚴重春季型角膜結膜炎(VKC) 使用劑量建議在春季型角膜結膜炎(VKC)發生季節期間，一天四次(早上、中午、下午與晚上) 使用於患眼、每次點一滴 IKERVIS。如果季節結束後，仍持續發生 VKC 徵兆與症狀，可依建議劑量持續治療，或者當徵兆與症狀已獲得適當控制，降低劑量至每天兩次、一次一滴。徵兆與症狀消退後應中止治療，復發時再開始用藥。		
注意事項	11. 在給藥前，應輕微搖動單一劑量包裝。 12. 單一劑量包裝僅供單次使用。每支單一劑量包裝足夠用於治療雙側眼部，應立即丟棄任何未用完的眼用乳劑。 13. 應指示患者在使用眼用乳劑後壓住鼻淚管，並闔上眼瞼 2 分鐘以減少全身性吸收。如此可減少全身性不良反應及增加局部活性。 14. 若使用超過一種局部眼用藥物，則給藥時間必須間隔至少 15 分鐘。		
其他	進用後， 刪除藥品 39C259 Restasis (Cyclosporin 0.05%) 麗眼達眼用乳劑		
可能的副作用	眼睛灼熱，眼睛充血，眼睛瘙癢		

藥品圖樣



藥劑部藥管組 109.07.24