

藥劑簡訊

編號：1091101

恢復供藥：


藥品 24P079 Acertil (Perindopril 5mg)雅施達膜衣錠

藥劑部藥管組 109.11.04

公 告

新進藥品

編號：1091102


藥品英文名	U-relax								
藥品中文名	優芮珂絲								
主成分名	Lactobacillus GR-1 & Lactobacillus RC-14 20 顆/瓶 (口服劑型) (每顆膠囊 180mg 含菌數為 5*10 ⁹ CFU)								
藥品代碼	26L092	廠牌 / 代理商	Chr Hansen						
用法用量	感染中：每晚睡前 2 顆 # 孕婦生理調養期：每晚睡前 1 顆 長期保養： <table border="1"><tr><td>感染期</td><td>第 1~5 日每晚睡前 2 顆</td></tr><tr><td>恢復期</td><td>第 6~35 日每晚睡前 1 顆</td></tr><tr><td>保養期</td><td>第 36 日開始每星期 2 顆</td></tr></table>			感染期	第 1~5 日每晚睡前 2 顆	恢復期	第 6~35 日每晚睡前 1 顆	保養期	第 36 日開始每星期 2 顆
感染期	第 1~5 日每晚睡前 2 顆								
恢復期	第 6~35 日每晚睡前 1 顆								
保養期	第 36 日開始每星期 2 顆								
用藥注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 定殖於陰道中,恢復及維持女性陰道正常菌落。2. 治療細菌性陰道感染。3. 改善反覆發生型生殖泌尿道感染。4. 配合抗生素(metronidazole)治療效果顯著,須間隔 1~2 小時後服用。								
藥品圖樣									

藥劑部藥管組 109.11.04

公 告

新進藥品

編號：1091103

藥品英文名	Smofkabiven		
藥品中文名	斯莫克必恩中心靜脈輸注液 493 毫升		
主成分名	Sodium acetate trihydrate (eq to sodium acetate 3H ₂ O) 、 Calcium chloride dehydrate 、 Potassium chloride 、 Glucose monohydrate 、 Soybean oil (eq to soya bean oil) 、 Fish-oil rich in omega-3 acids 、 L-alanine 、 L-arginine 、 L-histidine 、 L-isoleucine 、 L-leucine 、 L-lysine acetate 、 L-methionine 、 L-phenylalanine 、 L-proline 、 L-serine 、 L-threonine 、 L-tryptophan 、 L-tyrosine 、 L-valine 、 Glycine (eq to aminoacetic acid)(eq to glycocoll) 、 Magnesium sulphate heptahydrate 、 Triglycerides medium chain 、 Taurine (eq to aminoethyl sulfonic acid) 、 Sodium glycerophosphate 、 Zinc sulphate heptahydrate 、 Olive oil		
藥品代碼	17S162	廠牌 / 代理商	Fresenius Kabi
衛生署核准適應症	靜脈營養輸注，適用於無法由口腔進食或經腸道獲取足夠營養，或禁止由口腔及腸道進食之成年患者及 2 歲以上兒童。		
用法用量	<p>成人：SmofKabiven 的劑量介於 13~31 毫升/公斤體重/天。輸注速率不可超過 2.0 毫升/公斤體重/小時。建議輸注時間為 14~24 小時。建議每日最大劑量為 35 毫升/公斤體重/天。</p> <p>青少年(12-18 歲)：SmofKabiven 使用之劑量可以依照成人。</p> <p>兒科病人(2-11 歲)：最高劑量為 35 毫升/公斤體重/天，建議最大輸注速率為 2.4 毫升/公斤體重/小時。建議每日最大劑量為 35 毫升 / 公斤體重 / 天。</p>		
其他注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本品三個腔室的內容物混合後為白色乳劑。混合液於冷藏 2-8 度或 25 度下可保存 24 小時 2. 靜脈內使用，輸注至中央靜脈。 		
可能的副作用	注射部位局部反應		
藥品圖樣			

公 告

新進藥品

編號：1091104

藥品英文名	Entyvio Powder for Concentrate for Solution for Infusion		
藥品中文名	安潰悠凍晶注射劑		
主成分名	Vedolizumab 300mg		
藥品代碼	10E126	廠牌 / 代理商	HOSPIRA/台灣武田
衛生署 核准適應症	成人潰瘍性結腸炎；成人克隆氏症		
用法用量	用於潰瘍性結腸炎或克隆氏症成年患者：建議劑量為 300 毫克，使用方式為第 0、2 和 6 週時以靜脈輸注方式給藥，之後每隔 8 週給藥一次。第 14 週末出現治療效益證據的患者應停止治療。		
其他注意事項	<ol style="list-style-type: none">以 4.8 毫升注射用無菌水配製，切勿用力搖晃或倒轉，抽取 5 毫升(300 毫克)配製好的溶液，加入 250 毫升的無菌 0.9%氯化鈉溶液，並輕輕晃動輸注袋。溶液應為清澈或半透明，無色至淺棕黃色，且不含任何可見顆粒。靜脈輸注 30 分鐘方式給藥，未使用的輸注溶液請丟棄，請勿以靜脈注射或推注方式給藥。輸注後，用 30mL 無菌 NS 沖洗。輸注溶液可在 2°至 8°C(36°至 46°F)下存放最長 4 小時。不可冷凍。未使用的輸注溶液請丟棄。在輸注期間觀察病人(直到完成)並監測過敏反應；如果發生反應應停止輸注		
可能的副作用	頭痛、關節痛、鼻咽炎、疲勞、感冒症狀		
藥品圖樣			