

藥品簡介

主成分	Prednisolone
商品名	Compesolon
中文名	康速龍錠
含量	5mg/錠
藥品外觀	

作用

Prednisolone 是類固醇製劑，可用以治療許多不同的疾病。它可以協助預防及治療器官移植所引起的排斥作用，並防止移植時所帶來的發炎反應。

用法

1. 請確實遵照醫師指示的用法及藥量，規律服藥。
2. 最好在早上服藥，以免影響您的睡眠。
3. 每一顆藥物劑量為 5mg，劑量換算如下：

10mg = 2 顆	25mg = 5 顆
15mg = 3 顆	30mg = 6 顆
20mg = 4 顆	

4. 如果您無法確知正確的服用數量，請詢問您的醫師、藥師或護理人員。

使用禁忌

1. 若您曾對本類藥品(類固醇)產生過敏現象者，請告訴您的醫師。
2. 若您有任何黴菌感染的情形(如：念珠菌感染)，請務必告訴您的醫師。

注意事項

1. 勿自行服用市售成藥。
2. 本品須與食物併服以減少胃部不適感。
3. 服用本藥後必須慢慢減量才可完全停藥，請勿在未告知醫師的情況下，自行突然停藥。
4. 服用本藥可能會使您比較容易受到感染，因此最好避免進出公共場所並遠離患有感冒及其他感染症之人群。
5. 若您有下述情形，服用本藥前，請告訴您的醫師：懷孕、哺乳中、出血性疾病、高血壓、甲狀腺功能低下、肝病、腎病、精神官能症、重症肌無力、骨質疏鬆症、胃腸道疾患。
6. 若您受到任何感染(如：蟻蟲感染、病毒感染)時，也請通知您的醫師。

藥物可能之副作用

- 1 副作用的發生因人而異，一旦有副作用發生，就要多加小心。
2. 通常在治療期間隨著劑量的調整，大部分的副作用就會消失或有所改善。
3. 如果所發生的副作用嚴重影響您，請告知您的醫師。

►若您於服藥後發生下述狀況，請儘速就醫：

解血便、黑便或油便，視力模糊，肌肉無力或痙攣，嚴重胃痛，不明原因的發燒或喉嚨痛。

►若您於服藥後發生下述狀況，請告知醫師：

液體與鹽分的滯留、高血糖、傷口不易癒合、體重增加、挫癢、皮膚變薄、胃潰瘍、灼熱感、白內障、青光眼、焦慮、內分泌失調、骨質疏鬆、容易感染、兒童生長抑制。

忘記服藥時之處置

因為 prednisolone 為一天服用一次的藥品，因此，一天中任何時候忘了都應立即補服，下一次仍依常規時間服藥。如果您隔天才想起忘了服藥，則不需補服藥物，只要服用當天的藥量即可；**請勿一次服用兩倍劑量。**

藥品儲存指示

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫、日照或潮濕處。
2. 請將藥品置放於兒童拿不到的地方，避免幼兒誤服。

****若您仍有使用藥物之相關問題，請打電話或當面詢問您的醫師或藥師。**

****您可以先將問題記錄下來，並說明您的姓名、病歷號、及藥袋上的藥名，我們將盡力為您答覆。**

藥物衛教單 08

Prednisolone

康速龍®



使用須知

用藥諮詢專線：06-6226999 轉 73101、77119

藥物諮詢信箱：clh5500@mail.chimei.org.tw

藥物查詢網站：www.chimei.org.tw

奇美藥丸子部落格：http://pharmacists.pixnet.net/blog

柳營奇美醫院藥劑科