

如何使用鼻噴劑

(一) 第一次用藥



第一次用藥前，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次(5-10次)，以確保噴出藥霧量均一(如圖所示)。



若到下次使用前的時間超過24小時，使用前請再重複上述動作，惟只需對空噴壓一次即可。

(二) 平常用藥



1. 擤鼻



2. 搖動藥瓶



3. 移動瓶蓋



4. 以圖示姿勢握住藥瓶



5. 用拇指壓住一邊鼻孔，將噴頭插入鼻孔，頭稍向前傾，開始用鼻吸氣。吸氣時用手按壓噴嘴，使之噴出指定劑量的氣霧。



6. 用口呼氣；如須第二次噴，請重複步驟5、6，吸入第二次噴劑。



7. 換手，並在另一邊鼻孔重複整個程序。

1. 擤鼻

(三) 用藥後



8. 用乾淨的紙巾或手帕抹乾噴嘴，蓋回蓋子

用法

請遵照醫師處方之劑量及頻次使用，未經醫師指示，切勿自行更改劑量。

注意事項

若您使用的鼻噴劑為 Swinin nasal spray (瑞寧)，不建議長期使用。請詢問醫師您的治療療程。

其他

藥品儲存指示

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤用。
3. 不可將本藥與他人分享，以免發生危險。

**若您仍有使用藥物之相關問題，請再詢問您的醫師或藥師。

鼻噴劑

能舒鼻	鼻舒
克鼻敏	瑞寧

使用須知

用藥諮詢專線：06-6226999 轉 73101、77119

藥物諮詢信箱：clh5500@mail.chimei.org.tw

藥物查詢網站：www.chimei.org.tw

奇美藥丸子部落格：http://pharmacists.pixnet.net/blog

柳營奇美醫院藥劑科