

開封藥物儲存方法

104.12.29 修訂

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
15A017	0.1%Bosmin	無須配製	-	-	0.1%Bosmin 院內規範安剖開封後不保存
32A011	5%Alcaine 眼藥水	無須配製	-	避光冷藏,若溶液變色或開封 28 天後則丟棄不用	5%Alcaine 眼藥水
12X014	1%Xylocaine	無須配製	立即丟棄	立即丟棄	1%Xylocaine
33P056	2%Pilocarpine HCl 眼藥水	無須配製	1 個月	-	2%Pilocarpine HCl 眼藥水
12X048	4% Xylocaine	無須配製	-	72hr	4% Xylocaine(含防腐劑可多次使用)
23A002	Acetaminophen Syrup (Anti-Phen)	無須配製	三個月	三個月	Acetaminophen Syrup (Anti-Phen)
17I170	Actrapid HM	無須配置	28 天	42 天	Actrapid HM

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11Z028	Acyclovir (Zovirax)	NS	立即使用	不可冷藏	<ul style="list-style-type: none"> 每 500mg 需用 100ml 的稀釋液稀釋，避免給藥濃度 > 5mg/ml 不可使用含有保存劑的注射用水配製
10A110	Albumin	無須配置	開封後須立即使用，未用完則丟棄	不可冷藏	Albumin
11A015	Amikacin (Unikin)	無須配置	NA	NA	Amikacin (Unikin)
15A025	Aminophylline (Asiphylline)	無須配置	開封立即使用		Aminophylline (Asiphylline)
11F028	Amphotericin B (Fungizon)	無菌注射用水	24hrs (暗處)	7day	Amphotericin B (Fungizon)
11P060	Ampicillin (Ampolin)	IM：無菌注射用水 1.8ml (250mg/ml)	1hr		Ampicillin (Ampolin)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11P171	Aq-PCN(Penicillin G Sodium)	無此藥品	無此藥品	無此藥品	Aq-PCN (Penicillin G Sodium)
11A118	Augmentin (<u>Augmentin</u>)	20ml 注射用水配製	配製液於 20 分鐘內使用	配製液於 20 分鐘內使用	<ul style="list-style-type: none"> • AUGMENTIN 在含有葡萄糖、聚葡萄糖或重碳酸鹽的輸注液中較不穩定。因此，泡製後的 AUGMENTIN 溶液不可加入這類輸注液中 • IV 推 3-4 分, IV 滴 30-40 分
10B080	Bevacizumab (Avastin)	無須配置	開封立即使用	開封立即使用	(1)只可用 N/S 稀釋, 禁用 Dextrose (2)初用患者建議 IV 滴大於 90 分鐘 (3)禁 IV 推或 IV bolus
35B012	Bisolvon	-	3 個月(廠商提)	-	Bisolvon
17C025	Calcitonin	無須配置	拆封後立即使用	拆封後立即使用	Calcitonin
11C085	Cefazoline (Cefazolin)	D/W D5W NS	24 小時	96 小時	Cefazoline (Cefazolin)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11C207	Cefpirome (Cefrom)	以 10ml 注射用水	-	24 小時	Cefpirome (Cefrom)
11C120	Ceftazidime (Tatumcef)	注射用水	12 小時	4 天	3ml 注射用水配製後可 IM 10ml 注射用水配製後 (1)可 IVP (2)加入 50ml 輸注液中可 IVD
11C170	Ceftriaxone (Sintrix)	D/W NS D5W D10W G/W 2.5%+0.4 5%NaCl	6 小時	24 小時	<ul style="list-style-type: none"> • IM 每部位 ≤ 1g • IV 有可能發生靜脈炎
11Z010	Cefuroxime (Cefuroxime)	無菌注射用水 (D/W)	24 小時 (25°C 避光儲存)	48 小時 (顏色變深但不影響藥效)	<ul style="list-style-type: none"> • 避光儲存
11C231	Ciprofloxacin (Ciproxin)	無須配置	立即使用	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對光敏感，使用前才移除紙盒 2. 由大靜脈輸注 3. 輸注液不可存放於冰箱以免發生沉澱

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11C027	Clindamycin (Clincin)	NS D5W LR	24 小時	32 天	<ul style="list-style-type: none"> • IM 每個劑量應小於 600mg • 需經稀釋後才可靜脈注射
25C052	Codeine-cofsolin syrup (Consrine)	-	3 個月	3 個月	Codeine-cofsolin syrup (Consrine)
23P073	Cyproheptadine Syrup (Showmin)	-	一個月	-	Cyproheptadine Syrup (Showmin)
26M034	Cytotec 錠劑	-	<30° c	-	Cytotec 錠劑
38D010	DDAVP	無	室溫 25°C 以下存 放。開封 後冷藏 或室溫以 下可存放 30 天		DDAVP
17D064	Dexamethasone (Oradexon)	無須配置	開封後， 未用完藥 液請丟棄	開封後，未 用完藥液 請丟棄	Dexamethasone (Oradexon)
13V018	Diazepam (Dianlin)	無須配置	開封後立 即使用	開封後立 即使用	Diazepam (Dianlin)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
13V034	Diclofenac (Painstop)	開瓶後立即使用			Diclofenac (Painstop)
14D052	Dobutamin	-	原瓶開封後可依有效期限存放	原瓶開封後可依有效期限存放	Dobutamin
14D028	Dopamin	-	稀釋後溶液應儘速使用	稀釋後溶液應儘速使用	Dopamin 1. 稀釋後溶液應儘速使用。 2. 以大靜脈輸注，以避免藥液外滲引起壞死。 3. 不可與鹼性溶液/氧化劑/鐵劑混合注射。 4. 給藥時應使用 infusion pump。 5. 預防藥物血管外滲
11E013	Erythromycin (Erythrocin)	限用無菌水溶解本品	以 10ml 注射用水配製後, 25°C 可保存 24hr	2-8 °C 可保存 14 天	Erythromycin (Erythrocin)
11F147	Fluconazole (Genazole)	不須稀釋給藥	未用完之殘液請丟棄	未用完之殘液請丟棄	Fluconazole (Genazole)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11F139	Flomoxef (Flumarin)	W D5W NS	6hr	24hr	Flomoxef (Flumarin)
18L018	Furosemide (Rasitol)	無須配置	立即使用	立即使用	Furosemide (Rasitol)
11G059	GM (Gentamycin)	無須配置	X	不建議	GM (Gentamycin)
11H109	HBIG	NA	立即使用	立即使用	Hepatitis B immunoglobulin/Hyper HEP B
14H018	Heparin sodium	無須配置	X	15天內使用、不宜超過一個月	Heparin sodium/Agglutex
17H038	Hydrocortisone (Solu-Tisone)	注射用水 2ml N/S 2ml	立即使用	N/A	Hydrocortisone (Solu-Tisone)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11T076	Imipenem-cilastatin (Tienam)	N/S 10ml D5W 10ml D10W 10ml D5S 10ml Suntose 10ml	4hr (In 100ml N/S, D5W, D10W, D5S. Suntose ; imipenam 平均濃度 5 mg/ml)	24hr (In 100ml N/S, D5W, D10W, D5S .Suntose ; imipenam 平均濃度 5 mg/ml)	Imipenem-cilastatin (Tienam)
10I182	Immunoglobulin human/Human immunoglobulin (IVIG)	無須配置	立即使用	立即使用	Immunoglobulin human/Human immunoglobulin
17P084	K ₃ PO ₄	無須配置	開封後立即使用		K ₃ PO ₄
26K048	Kaopectin	無此品項		-	Kaopectin
17K013	KCl	無須配置	開封後立即使用		KCl

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
13L026	Lorazepam (Anxicam)	無須配置	開封後立即使用		Lorazepam (Anxicam)
17M033	Mannitol	無須配置	開封後立即使用		Mannitol
11M027	Meropenem (Mepem)	N/S G10W	以 N/S 稀釋 : 8hrs 以 G10W 稀釋 : 2hrs	以 N/S 稀釋 : 48 hrs 以 G10W 稀釋: 8hrs	Meropenem (Mepem)
17S019	Methyl-prednisolone (Solu-medrol)	無菌注射用水	48 小時	NA	Methyl-prednisolone (Solu-medrol)
11S011	Metronidazole (SABS)	無需配置	開封後立即使用	-	Metronidazole (SABS)
16M019	MgSO ₄	無需配置	打開後立即使用	-	MgSO ₄
13M015	Midazolam (Midatin)	無需配置	開封或稀釋後 24 小時內使用完畢。	5°C 以下，維持 3 天	相容: NS、LR、D5W 禁用: 鹼性溶液(會沉澱)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11M035	Minocycline (Mirosin)	無此品項			Minocycline (Mirosin)
10M045	Mitomycin-C	注射用水	儘快使用	-	藥效可能因溶解液的PH值太低而減弱，藥液製成後儘快使用，避免與低PH的注射液混合。
	Mixtard				Mixtard
26M084	Mucaine Susp (ULSTAL Susp.)	-	見包裝標示	無須冷藏	Mucaine Susp (ULSTAL Susp.)
26W018	Mylanta Susp (ULWYCON Susp.)	無需配置	7天	7天	Mylanta Susp (ULWYCON Susp.)
14N036	NTG Inj	D/W NS D5W LR	48小時	7天	NTG Inj
160013	Omeprazole (Losec)	D5W N/S	D5W:6hr N/S:12hr	無資料	Omeprazole (Losec)
11P105	Oxacillin (Prostaphlin)	D/W NS	3day	7day	Oxacillin (Prostaphlin)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
180019	Oxytocin (Pitocin)	無需配置	開封後立 即使用	開封後立 即使用	Oxytocin (Pitocin)
13P016	Pancuronium (Pavulon)	無需配置	開封後立 即使用	開封後立 即使用	Pancuronium (Pavulon)
	PCT	Dist. W		10 天	PCT
38D044	PGE ₂ 陰道塞劑	無需配置	至效期	至效期	PGE ₂ 陰道塞劑
13P058	Phenytoin (Aleviatin)	無需配置	-	-	Phenytoin (Aleviatin)
11P086	Piperacillin (Pitamycin)	DW NaCl D5W Suntose L. R	24 小時	48 小時	Piperacillin (Pitamycin)
11P078	Piperacillin+ Tazobactam (Tazocin)	W D5W NS	24 小時	48 小時	Piperacillin+Tazobactam (Tazocin)
12P018	Propofol (Fresofol)	-	立即使用	-	Propofol (Fresofol)
16R014	Ranitidine (Vesyca)	-	立即使用	-	Ranitidine (Vesyca)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
16S029	Sandostatin		立即使用	24 小時 (使用前 須回復室 溫)	Sandostatin
15B014	Survanta	-	已開封有 剩餘藥品 應丟棄	未開封可 在溫熱後 24hr 內放 回冰箱供 下次使 用，且不 應超過一 次。	Survanta
11T034	Tecoplanin (<u>Targocid</u>)	NS LR D5W 0.18%NaC 1/ 4%Dextro se 含 1.36% 或 3.86%Dex trose 腹 膜透析液	配置後應 立即使 用，無法立 即使用需 存於 2-8 度	24 小時	Tecoplanin (<u>Targocid</u>)

藥品代號	藥物名稱 (學名/商品名)	配置溶液	保存期限		備註 (學名/商品名)
			室溫	冷藏	
11T103	Tetanus Toxid	-	-	24 小時	Tetanus Toxid
25T027	Theophylline Syrup (Cetertheo Syrup)	-	-	-	Theophylline Syrup (Cetertheo Syrup)
17P111	TPN		24hr	72hrs	TPN
17K021	Triamcinolone (Winacort-A)	無須配置	7 天	-	Triamcinolone (Winacort-A)
14U035	Urokinase	NS D5W	-	24hr	Urokinase
11V020	Vancomycin	20mL DW	建議冷藏 保存	96hr	Vancomycin
18P024	Vasopressin (Pitressin)	無須配置	立即使用	立即使用	Vasopressin (Pitressin)
17V121	Vit K ₁	無須配置	立即使用	立即使用	Vit K ₁

注意：以上任何資訊皆應以本院現有之藥品仿單為主，其他參考資料為輔。使用時仍須配合臨床狀況做適當之調整。
參考資料 1. 仿單 2. Micromedex 3. Uptodate