

公 告

新進藥品

編號：1040502

藥品英文名	Aminofluid		
藥品中文名	氨基富液		
主成分名	Sodium lactate solution Sodium chloride Glucose L-alanine L-arginine L-aspartic acid L-cysteine Glutamic acid L-histidine	L-isoleucine, L-leucine Lysine- HCL L-methionine L-phenylalanine L-proline L-serine L-threonine, L-tryptophan	L-tyrosine L-valine Glycine Magnesium sulfate hydrate Potassium phosphate Calaium gluconate Zinc sulfate hydrate
藥品代碼	17A108	廠牌／代理商	台灣大塚
衛生署 核准適應症	手術前後之營養補給、低蛋白血症、消化道潰瘍、營養障礙之補給。		
用法用量	通常成人一回 500 mL 由末梢靜脈持續輸注。成人標準輸注速度為 120 分鐘內輸注 500 mL。老人與重症患者應減緩輸注速度。劑量應依症狀、體重、年齡作適宜增減。每日最大投與劑量為 2500 mL。		
禁忌症	1. 有肝性昏迷或有肝性昏迷之虞的患者。[因為氨基酸代謝異常，可能使症狀惡化] 2. 重症腎障礙或高氮血症患者。[容易造成水分、電解質的過量投與，使症狀惡化]。 3. 氨基酸的代謝產物尿素等可能滯留，使症狀惡化] 4. 充血性心衰竭患者。[循環血液量增加，導致心臟負擔，可能使症狀惡化] 5. 嚴重酸中毒（高乳酸血症等）患者。[可能使症狀惡化] 6. 電解質代謝異常患者。[可能使症狀惡化] (1) 高鉀血症患者（寡尿、Addison's 症等）。 (2) 高磷血症患者（副甲狀腺機能低下等）。 (3) 高鎂血症患者（甲狀腺機能低下等）。 (4) 高鈣血症患者。 7. 因尿道阻塞而尿量減少的患者。[容易造成水分和電解質的過量，可能使症狀惡化] 8. 氨基酸代謝異常患者。[因輸注的氨基酸無法正常代謝，可能使症狀惡化]		
常見副作用	發疹，噁心，嘔吐，胸部不適，心悸，AST (GOT), ALT (GPT), ALP 或總膽紅素值上升，血管痛，靜脈炎〔寒顫，發熱，熱感，頭痛〕		
注意事項	1. 為保持產品的安定性，脫氧劑置放於密封的內、外兩層包裝袋之間，所以在使用時才打開外層包裝。 2. 上室液（氨基酸液）可能因為環境溫度的變化而有結晶析出。使用前，在 15~25°C 的環境溫度下搖動本劑以使結晶溶解。 3. 外層包裝袋有破損，溶液變色或沉澱物無法因搖動而溶解時，請勿使用。		

	<p>4. 產品出現上、下室液已混合或二室之間的黏接處呈現白色時（黏接處已剝落時會呈現白色），請勿使用。</p> <p>5. 橡皮塞上供針頭穿刺的標記處應與針頭垂直，若未垂直穿刺橡皮，針頭可能穿過瓶頸而造成液漏。</p> <p>6. 軟袋製品請勿以連接管串聯輸注。</p> <p>7. 外層包裝袋的內側出現水滴或液漏，注射液變色或混濁時，請勿使用。</p> <p>8. 包裝上的容量刻度可能不夠準確，僅供參考用。</p>
其他	<p>104 年 3 月藥委會通過新進品項，同時刪除 17A039 Aminoplex。</p> <p>原品項（17A039 Aminoplex）用畢後逕行取代。</p>
藥品圖檔	

藥劑部藥管組 104.05.01