

新進藥品

藥品英文名	Jardiance		
藥品中文名	恩排糖膜衣錠 25 毫克		
主成分名	Empagliflozin 25mg		
藥品代碼	27E113	廠牌／代理商	BOEHRINGER INGELHEIM
衛生署 核准適應症	第二型糖尿病		
用法用量	<p>JARDIANCE 可單獨使用亦可與 metformin、metformin 併用 sulfonylurea、pioglitazone(併用或不併用 metformin)、胰島素(併用或不併用 metformin 及/或 sulfonylurea)合併使用，做為附加於飲食控制及運動之外的治療藥物，藉以改善第二型糖尿病患的血糖控制效果。</p> <p>JARDIANCE 的建議劑量為每日早上一次、每次 10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。當耐受性良好，劑量可提升至 25 mg。</p>		
可能的副作用	血脂異常，尿路感染，暈眩，噁心...等		
用藥注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 常見的不良反應為泌尿道感染和生殖器黴菌感染。 2. 目前尚未有針對人類懷孕期間使用 JARDIANCE 的研究，只有在評估其可能效益大於對胎兒可能的風險時，才可在懷孕期間使用 JARDIANCE。 3. 目前仍不清楚 JARDIANCE 是否會分泌至乳汁內；然而，動物研究資料顯示 JARDIANCE 可能對攝取母乳的嬰兒造成危害。 4. 請告知病患使用 JARDIANCE 時可能發生低血壓，並建議病患發生低血壓的症狀時應與醫護人員聯繫，且應攝取充足的水分。 		
藥品圖樣			

公 告

編號：1050707

新進藥品

藥品英文名	Galvus		
藥品中文名	高糖優適錠 50 毫克		
主成分名	Vildagliptin 50mg		
藥品代碼	27V154	廠牌／代理商	NOVARTIS
衛生署 核准適應症	第 2 型糖尿病。作為單一治療－針對僅經由運動與飲食無法良好控制的患者，以及因不耐受或是禁忌症而認定為不適合使用 metformin 的患者。作為合併治療－宜用於已使用 metformin 或 sulphonylurea 或 thiazolidinedione 且血糖控制不佳者。作為三合一治療－當飲食及運動加上 sulphonylurea 及 metformin 雙重療法無法提供適當的血糖控制時，vildagliptin 可與 sulphonylurea 及 metformin 併用作為三合一口服療法。當飲時及運動加上穩定劑量的胰島素無法提供適當的血糖控制時，vildagliptin 亦適合與胰島素合併使用(併用或不併用 metformin)。		
用法用量	成人： Vildagliptin 作為單一治療使用、與 metformin 合併使用、與 thiazolidinedione 合併使用、與 metformin 及 sulphonylurea 合併使用，或與胰島素合併使用(併用或不併用 metformin)時，vildagliptin 每日建議劑量為 100 毫克，分別於早晨與晚間服用 50 毫克。若與 sulphonylurea 合併使用，vildagliptin 每日建議劑量為 50 毫克，每日一次早晨服用。對此類病人而言，每日 vildagliptin 100 毫克之劑量，並沒有較 50 毫克有效。與 sulphonylurea 合併使用時，可考慮使用較低劑量的 sulphonylurea，以減少低血糖的風險。使用劑量不建議使用高於 100 毫克。		
可能的副作用	低血糖，頭痛，暈眩，噁心...等		
用藥注意事項	5. 老年患者(大於等於 65 歲)老年患者不需調整劑量。 6. 腎功能不全：對輕度腎功能不全(肌酸酐廓清率大於等於 50 ml/min)的患者而言，無需調整劑量。 7. 對於中度或重度腎功能不全以及必須接受洗腎之末期腎臟疾病(ESRD)患者而言，Galvus®的建議劑量為每日一次 50 mg。 8. 肝功能不全：Galvus® 不建議使用於肝功能不全的患者，包括治療前 ALT 或 AST 大於正常值上限 3 倍者。 9. 小兒患者 (小於 18 歲) 因為缺乏此族群之安全及療效資料，Galvus®不建議使用於 18 歲以下之兒童青少年 患者。 10. 給藥方式口服使用。Vildagliptin 可於餐前或餐後服用。		
特殊使用注意事項	為避免潮濕，須儲存於原始包裝內。		

藥品圖樣



藥劑部藥管組 105.07.20