編號:1051138

新進藥品

藥品英文名	Jakavi		
藥品中文名	捷可衛錠		
主成分名	Ruxolitinib 5mg		
藥品代碼	20R049	廠牌/代理商	台灣諾華
衛生署 核准適應症	適用於治療 International Working Group (IWG) Consensus Criteria 中度風險-2或高風險之骨髓纖維化,包括原發性骨髓纖維化、 真性紅血球增多症後骨髓纖維化、或血小板增多症後骨髓纖維化。適用於接受 hydroxyurea 治療後有抗藥性或無耐受性的真性紅血球增多症患者。		
用法用量	1. 對血小板計數介於 100,000 和 200,000/mm3 之間的患者 · Jakavi 的建議起始劑量為 15 毫克每日口服兩次 · 對血小板計數 > 200,000/mm3 的患者則為 20 毫克每日兩次 · 對血小板計數介於 50,000 和 100,000/mm3 之間的患者 · 由於現有的資料有限 · 因此無法提供起始劑量方面的建議 · 這類患者的最高建議起始劑量為 5 毫克每日兩次 · 之後並應小心調整劑量。 2. Jakavi 的最高劑量為 25 毫克每日兩次 ·		
可能的副作用	肝功能異常,貧血,頭痛,腹部不適		
用藥注意事項	1. 輕度或中度腎功能不全的病患,不需要特別調整劑量。對嚴重腎功能不全(N酸酐廓清率(Clcr) 低於30 毫升/分鐘)的骨髓纖維化病患,應依據血小板計數將建議起始劑量降低約50%,以每日兩次的方式投予。嚴重腎功能不全的真性紅血球增多症患者的建議起始劑量為5毫克,每日兩次。 2. 對任何程度的肝功能不全病患,應依據血小板計數將建議起始劑量降低約50%,並以每日兩次的方式給予。維持劑量應依據小心監測病患的安全性和療效後調整。應小心監測安全性與療效結果,以調整維持劑量。對於肝功能不全的患者,在接受 Jakavi 治療開始的六週內,應至少每隔一到兩週,進行全血細胞計數,包括白血球細胞分類計數;肝功能和血細胞計數漸趨穩定後亦須視臨床需要進行全血細胞及白血球細胞分類計數檢測。據此,可以調降Jakavi 劑量,以減少血球低下症的風險。 3. 兒童:Jakavi 用於18 歲以下兒童病患的安全性與療效尚未確立。4. 老年人:對老年病患,不建議額外調整劑量。		
特殊使用注意事項	Jakavi 應口服給藥,且可與	與食物併服・亦可不	^下 與食物併服。



藥劑部藥管組 10511.29

新進藥品

編號:1051139

藥品英文名	Zulitor		
藥品中文名	平脂膜衣錠		
主成分名	Pitavastatin 4mg		
藥品代碼	24P089	廠牌/代理商	友霖生技
衛生署 核准適應症	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常		
用法用量	成人每日一次口服 Pitavastatin 1~2mg。劑量可依年齡、症狀作適當增減,低密度膽固醇值(LDL-C)降幅不足時可調升劑量,每日最高服用劑量為4mg。 在 Pitavastatin 療程開始後或逐步調整劑量時,應於 4 週後檢測血脂濃度並據以調整劑量。		
可能的副作用	紅斑、發疹、搔癢、乾嘔、噁心、胃部不適、下痢、AST(GOT)上昇、ALT(GPT) 上昇、 γ-GTP 上昇、ALP 上昇、LDH 上昇、CK(CPK)上昇、肌肉疼痛、 無 力感、頭痛、頭重感、麻痺、目眩、倦怠感、頭重感、麻痺、目眩 肌肉痙攣 緊繃、嗜睡、失眠、睪固酮低下、貧血、抗核抗體陽性		
用藥注意事項	1. 中、重度腎功能不全(腎絲球濾過率分別為 30-59 mL/min/1.73m2 及 15-29 mL/min/1.73m2)及正接受血液透析的末期腎臟病患者, Pitavastatin 起始劑量應為每日一次 1mg, 最高劑量為每日一次 2mg。 2. 服用 Erythromycin 的患者, Pitavastatin 每日單次劑量不可超過 1mg 3. 服用 Rifampin 的患者, Pitavastatin 每日單次劑量不可超過 2mg。		
特殊使用注意事項	Pitavastatin 每日一次劑量超過 4mg 時會增加罹患嚴重肌肉病變(myopathy)的 風險。Pitavastatin 每日單次劑量請勿超過 4mg		
藥品圖樣	4 7 9993 7 9083 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		59 ₃₀ 40

編號:1051140

即日起,品項代號 16P010 Metoclopramide 10mg/2ml 針劑年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	Pulin	Imperan	
藥品中文名	普林注射液	英百朗注射液	
主成分名	Metoclopramide <u>10mg/2ml</u>		
廠牌/代理商	永信	南光	
衛生署核准適應症	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎,糖尿病引起之胃腸蠕動異常		
	舊藥	新藥	
藥品圖樣	2 milestodorando hydrociologo de la companya de la	で	

藥劑部藥管組 105.11.29

公 告

編號:1051141

即日起,品項代號 23A060 Lorazepam 0.5mg 錠劑年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	Lowen	Ativan	
藥品中文名	樂穩 錠	安定文錠	
主成分名	Lorazepam 0.5mg		
廠牌/代理商	中化 美商惠氏		
衛生署核准適應症	焦慮失眠		
	 		
藥品圖樣	中國化學 中國化學 樂穩 錠0.5公絲 樂穩 錠0.5公絲 (樂耐平) Lowen Tablets 0.5mg (Lorazepam) °C.C.P.*	Wyeth* Ativan* (lorazepam) (lorazépam) (lorazepán) 0.5 mg Ativan Ativan (J.5 mg Ativan A	

藥劑部藥管組 105.11.29

公 告

編號:1051142

即日起,品項代號 23N053 Nordazepam 5mg 錠劑年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	Calmday	Nargin	
藥品中文名	康眠定糖衣錠	納靜膜衣錠	
主成分名	Nordazepam 5mg		
廠牌/代理商	SANICO N.V./吉富	萬宇康	
衛生署核准適應症	焦慮、緊張所引起的精神障礙		
	舊藥	新藥	
藥品圖樣	With the state of	A	

藥劑部藥管組 105.11.29

編號:1051143

即日起,品項代號 23R027 Risperidone 2mg 錠劑年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	ANXILET	Perisdone	
藥品中文名	悠寧膜衣錠	普利思妥 膜衣錠	
主成分名	Risperidone 2mg		
廠牌/代理商	永信皇佳		
衛生署核准適應症	精神分裂症之相關症狀,雙極性疾患之躁症發作。治療失智症病人具嚴重攻擊性,或精神分裂症類似症狀。		
	舊藥	新藥	
藥品圖樣	Risperidone 2mg Risperidone 2mg Risperidone 2mg Risperidone 2mg Risperidone 2mg Risperidone 2mg Ocm 1 2 3 4	Perisdone F.C. Tab 2mg "Royal" (Risperidone)	

藥劑部藥管組 105.11.29

公 告

編號:1051144

即日起,品項代號 24G010 Ginkgo Biloba Extract (40mg)錠劑年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	Ginkgocentrate	Schnin	
藥品中文名	杏銀膜衣錠	享寧膜衣錠	
主成分名	Ginkgo Biloba Extract 40mg		
廠牌/代理商	杏輝 中化		
衛生署核准適應症	末梢血行障礙		
	舊樂	新藥	
藥品圖樣	Twin H : 2014. 103 17		

藥劑部藥管組 105.11.29

編號:1051145

即日起,品項代號 39M029 Menthol oil (450ml/BT)年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換新廠牌,說明如下,謝謝!!

藥品英文名	Peppermint oil	Oleum Menthae
藥品中文名	薄荷油	
主成分名	Menthol oil	
廠牌/代理商	洗洋 瑞升	
衛生署核准適應症	芳香健胃驅風	
	舊樂	新藥
藥品圖樣	WORLD 注音	OLEUM MENTHAC OLEUM

藥劑部藥管組 105.11.29

編號:1051146

即日起,品項代號 39A128 Azelaic Acid Cream 30gm 年度招標變更廠牌,原廠牌如已無庫存即進行更換,變更為壽元廠牌 39A255 Azelaic Acid Cream 12gm,說明如下,謝謝!!

藥品代碼	39A128	39A255
藥品英文名	Leo	Azel
藥品中文名	蜜可舒乳膏	思媚乳膏
主成分名	Azelaic acid 20%, 30 g/tube	Azelaic Acid Cream 12gm
廠牌/代理商	順生	壽元
衛生署核准適應症	尋常性痤瘡。	
	舊藥	新藥
藥品圖樣	9	思 媚 乳膏 Azel cream

藥劑部藥管組 105.11.29