

公 告

新進藥品

編號：1061026

藥品英文名	Blincyto		
藥品中文名	百利妥注射劑		
主成分名	Blinatumomab 35mcg/V		
藥品代碼	10B191	廠牌 / 代理商	Boehringer/台灣安進
衛生署 核准適應症	BLINCYTO 適用於治療費城染色體陰性復發型或頑固型 B 細胞前驅因子之急性淋巴芽細胞白血病(ALL) 之成人病患。		
用法用量	<p>應在具備血液惡性疾病治療經驗的醫師監督下開始療程。單次 BLINCYTO 紿藥週期包含連續靜脈輸注 28 天，接著停藥 14 天 (總共 42 天)。</p> <p>一個療程包括 2 個週期的 BLINCYTO 引導治療，接著再給予 3 個週期的鞏固治療 (達到總共 5 個週期)。</p> <p>經過 2 個週期治療達到完全緩解的病人根據評估個別的效益風險，可接受至多 3 個額外週期的鞏固治療。</p>		
可能的副作用	發燒、頭痛、周邊水腫、嗜中性球低下合併發燒、噁心、低血鉀以及便秘。		
用藥注意事項	<ol style="list-style-type: none">使用 dexamethasone 進行前置用藥：對於成年病人，在每個週期給予第一個 Blincyto 劑量前與劑量增加前 (如第 1 個週期的第 8 天) 1 小時給予 20 mg dexamethasone，以及在中斷給藥 4 小時或中斷超過 4 小時後重新輸注給藥前 1 小時給予。Blincyto 輸液袋製備完成後，應在 24 小時或 48 小時內輸注完畢。應由治療醫師根據輸液袋更換的頻率，決定在 24 小時或 48 小時內輸注完畢。給予 Blincyto 溶液時，應使用含有無菌的、無致熱原、低蛋白結合且孔徑為 0.2 micron 管內過濾器的 IV 管線。重組 Blincyto：<ol style="list-style-type: none">(1) 將 3 mL 符合美國藥典的無防腐劑無菌注射用水沿著 Blincyto 小瓶壁注入，切勿直接加到凍晶粉末上面 (重組後的 Blincyto 濃度應為 12.5 mcg/mL)。(2) 輕輕旋動重組溶液避免起泡。切勿用力搖晃。在重組時以及輸注前，應目視檢查重組溶液是否有顆粒或褪色。(3) 重組後溶液應為澄清至略混濁，無色至微黃色。若溶液起霧或有沉澱，切勿使用。調配 Blincyto 輸液袋<ol style="list-style-type: none">(1) 在加入 IV 溶液穩定劑及重組 Blincyto 之前，以無菌操作法將 270 mL 符合美國藥典的 0.9% 氯化鈉注射液注入 IV 袋。(限用材質為 DEHP-free PVC、polyolefin 或 EVA 的 IV 袋/幫浦卡匣)。以無菌操作法抽出 5.5 mL 的 IV 溶液穩定劑，將此穩定劑加入含符合美國藥典的		

	<p>0.9% 氯化鈉注射液的 IV 袋中，輕輕地混合 IV 袋中溶液避免起泡。 IV 溶液穩定劑注射瓶內未用完的部分，請丟棄。</p> <p>(2) 以無菌操作法將重組後的Blincyto注入含 0.9% 氯化鈉注射液(符合美國藥典)和 IV 溶液穩定劑的 IV 袋輕輕地混合 IV 袋中溶液避免起泡。</p> <p>(3) 在無菌環境下，將 IV 管線與裝有孔徑 0.2 微米無菌管線過濾器的 IV 袋連結起來。(限用材質為 DEHP-free PVC、polyolefin 或 EVA 的管線，必須裝有無菌、無致熱原、低蛋白結合且孔徑為 0.2 微米的管內過濾器)。確定 IV 管線與輸注幫浦相容。</p> <p>(4) 排出 IV 袋內空氣。尤其在使用可攜式輸注幫浦時，這個步驟很重要。只能用已製備好的輸注溶液來充滿 IV 管線。不可用符合美國藥典的 0.9% 氯化鈉溶液來充滿管線。</p> <p>(5) 若未立即使用，應冷藏存放於 2°C 到 8°C。</p>
特殊使用注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 每盒 Blincyto 內含： 1 瓶限單劑使用的小瓶內含無菌、無防腐劑、白色至灰白色的 Blincyto 35 mcg 凍晶粉末及 1 瓶限單劑使用的 10 mL 玻璃小瓶內含無菌、無防腐劑、無色至微黃色的 IV 溶液穩定劑澄清溶液。切勿用 IV 溶液穩定劑來重組 BLINCYTO！ 開立此藥品時請同時開立 17S178 SOLUTIO NATRII CHLORIDI ISOTONICA (0.9% 250mL) "濟生"氯化鈉注射液塑膠瓶 (廠商贈送)
藥品圖樣	<p>另以3 mL 無防腐劑 無菌注射用水溶解</p>

公 告

新進藥品

編號：1061027

藥品英文名	Revlimid		
藥品中文名	瑞復美 膠囊		
主成分名	Lenalidomide 10mg		
藥品代碼	20L132	廠牌 / 代理商	CELGENE
衛生署 核准適應症	<p>1. Revlimid 與 dexamethasone 合併使用可治療先前已接受至少一種治療失敗之多發性骨髓瘤(multiple myeloma, MM)患者。</p> <p>2. Revlimid 可治療先前尚未接受過任何治療且不適合移植之成年患者。</p>		
用法用量	Lenalidomide 建議起始劑量為口服每日 10 mg、在 28 天用藥週期的第 1 至 21 天，每日服用直到 9 個用藥週期。口服 melphalan 0.18 mg/kg、在 28 天用藥週期的第 1 至 4 天每日服用，口服 prednisone 2 mg/kg 在 28 天用藥週期的第 1 至 4 天每日服用。完成 9 個用藥週期或因不耐受合併治療無法完成用藥週期的患者，繼續以 lenalidomide 口服每日 10 mg，在 28 天用藥週期的第 1 至 21 天，每日服用直到病情惡化。對於年齡 75 歲以上使用 Lenalidomide 合併使用 melphalan 及 prednisone 治療，無建議的劑量調整。		
可能的副作用	頭痛.失眠.腹瀉.貧血等		
用藥注意事項	<p>1. 應於每天的固定時間服用，可單獨服用或與食物併服。</p> <p>2. 膠囊應整粒以水送服。膠囊不應打開、打破或咀嚼。</p>		
特殊使用注意事項	請注意此藥有同成分不同劑量的品項 (Lenalidomide 25 mg) 。		
藥品圖樣			

公 告

編號：1061028

即日起，品項代號 27R045 Repaglinide (1mg) 錠劑年度招標變更廠牌，原廠牌如已無庫存即進行更換，說明如下，謝謝!!

藥品英文名	Relinide	Repaglinide
藥品中文名	糖立定錠	柔糖
主成分名	Repaglinide 1mg	
廠牌 / 代理商	生達化學製藥股份有限公司	中化裕民健康事業股份有限公司
衛生署核准適應症	第二型糖尿病 (NIDDM) 無法經由飲食控制、減重及加強運動等方法，達成良好控制者。	
藥品圖樣	<p>舊藥</p>  <p>更新日期:2014.10.16</p>	<p>新藥</p> 

藥劑部藥管組 106.10.25