

藥劑簡訊

編號：1070508

缺藥通知

1. 11H311 Gardasil 九價(0.5ml/V)嘉喜九價人類乳突病毒基因重組疫苗廠商缺藥，預計
恢復供貨時間未定，如恢復供藥則另行通知，現有藥品用完關檔，謝謝
2. 藥號 24N027 Prazosin (1mg) 錠 (商品名：Minipress)，廠商結束代理停止供貨，現有
藥品用完關檔，謝謝

藥劑部藥管組 107.5.31

新進藥品

公 告

編號：1070509

藥品英文名	Abilify Maintena		
藥品中文名	安立復美達持續性藥效肌肉注射用懸浮劑		
主成分名	Aripiprazole (400mg/V)		
藥品代碼	13A069	廠牌 / 代理商	台灣大塚製藥
衛生署 核准適應症	治療成人的思覺失調症 成人的第一型雙極性疾患維持治療之單一療法		
用法用量	<p>Abilify Maintena 的建議起始和維持劑量為每個月 400 毫克 (至少在前一次注射的 26 天後投與下一個劑量)。</p> <p>對從未使用過 aripiprazole 的患者，建議在開始使用 Abilify Maintena 治療之前須先確立其對口服 aripiprazole 之耐受性。由於口服 aripiprazole 之半衰期特性，需要至少 2 週的時間，全面評估 aripiprazole 的耐受性。</p> <p>在 Abilify Maintena 第一個劑量注射後，須接受連續 14 天的口服 aripiprazole (10~20 毫克)，以確保在 Abilify Maintena 初始治療期間 aripiprazole 可達到治療濃度。若患者已以其他的口服抗精神病藥物穩定治療 (且已知可耐受 aripiprazole)，在 Abilify Maintena 第一個劑量注射後，繼續接受連續 14 天的口服抗精神病藥物，以確保在 Abilify Maintena 初始治療期間維持抗精神病藥物的治療濃度。</p> <p>如投與 400 毫克的劑量發生不良反應，考慮減低劑量至每個月 300 毫克。</p>		
可能的副作用	抗精神病藥物惡性症候群、遲發性運動困難、新陳代謝變化、病態性賭博和其他強迫性行為、起立性低血壓、白血球減少、嗜中性白血球減少、粒性白血球缺乏症、癲癇發作、認知及運動能力受損、吞嚥困難、用於患有失智症相關精神疾病的老人病患死亡率升高、腦血管不良反應		
用藥注意事項	<p>假如遺漏第二或第三個劑量：</p> <ul style="list-style-type: none">• 如距離上一次注射已超過 4 週但小於 5 週，立即注射下一個劑量。• 如距離上一次注射超過 5 週以上，立即注射下一個劑量並同時重新給與口服 aripiprazole 14 天。 <p>假如遺漏第四個或是隨後的劑量：</p> <ul style="list-style-type: none">• 如距離上一次注射已超過 4 週但小於 6 週，立即注射下一個劑量。• 如距離上一次注射已超過 6 週以上，立即注意下一個劑量並同時重新給予口服 aripiprazole 14 天。		

	附有針頭保護套的 1.5 吋 (38 mm) 21 號安全針頭一支 (非肥胖病人使用) 附有針頭保護套的 2 吋 (51 mm) 21 號安全針頭一支 (肥胖病人使用)
特殊使用注意事項	須由醫師處方使用
藥品圖樣	 <p style="text-align: center;">更新日期:2018. 05. 23</p>

藥劑部藥管組 107.05.31

公 告

編號：1070510

新進藥品

藥品英文名	Mezavant EFC		
藥品中文名	"安適凡特"長效腸溶膜衣錠		
主成分名	Mesalazine 1200mg		
藥品代碼	21M137	廠牌 / 代理商	吉泰藥品股份有限公司 夏爾生技醫藥股份有限公司
衛生署 核准適應症	誘導輕至中度活動性潰瘍性結腸炎之緩解及維持緩解作用		
用法用量	<p>成人(包含65歲以上之老年人) 誘導緩解(一般療程為6-8週)：每日一次、每次2.4 - 4.8公克，最高建議劑量: 4.8公克。 維持緩解：每日一次、每次2.4公克。 目前在18歲以下兒童尚缺乏安全性及有效性資料。 尚未有針對肝腎功能不良病人族群之試驗資料。</p>		
可能的副作用	腹痛、頭痛、腹瀉、噁心、肝功能檢測異常、肌酸酐清除率降低		
用藥注意事項	需與食物併服，不可咬碎或咀嚼。		
特殊使用注意事項	<ol style="list-style-type: none">曾對乙醯水楊酸及其他水楊酸成分過敏者不能使用。曾有使用Mesalazine製劑之病人發生極小變化之腎病變、急性/慢性間質性腎炎及腎衰竭之腎功能不全報告，若已確定輕度至中度腎功能不全病人，需小心使用。建議所有病人進入治療前都要先評估腎功能，並在治療期間定期追蹤。曾有已有肝疾病的病人服用含Mesalazine製劑發生肝衰竭的報告，肝功能不全病人投與本品應特別小心。由於Sulfasalazine與Mesalazine間存在交叉過敏反應的潛在危險，因此治療對Sulfasalazine過敏病人要特別小心。慢性肺功能不全病人(尤其是氣喘病人)，因有發生過敏反應的危險應密切監測。		
藥品圖樣	 <p>更新日期:2018.05.24</p>		

公 告

編號：1070511

新進藥品

藥品英文名	Omacor Soft Capsules		
藥品中文名	脂妙清軟膠囊		
主成分名	Omega-3- Acid Ethyl Esters 90		
藥品代碼	24O016	廠牌 / 代理商	五洲/科進
衛生署 核准適應症	高三酸甘油酯(血)症		
用法用量	<p>起始治療每日兩次，每次 1 顆，餐後服用；若未達到適當之療效反應，可增加至每日兩次，每次 2 顆，餐後服用。</p> <p>對於 Omacor 用於小孩及 70 歲以上老人無相關研究，對於腎或肝功能不全患者亦無相關研究</p>		
可能的副作用	便祕、腸胃不適、嘔吐、搔癢、皮疹		
用藥注意事項	Omacor 是從數種魚類體內取得；目前尚不清楚對於魚類或甲殼類過敏的患者，是否會增加對 Omacor 過敏反應之風險。已知對魚類或甲殼類過敏之患者，應小心使用 Omacor		
特殊使用注意事項	自費品項、以瓶計價、一盒 28 顆。		
藥品圖樣			

藥劑部藥管組 107.05.31

公 告

編號：1070512

新進藥品

藥品英文名	Belviq		
藥品中文名	沛麗婷膜衣錠		
主成分名	Lorcaserin(10mg)		
藥品代碼	26L061	廠牌 / 代理商	Arena Pharmaceutical
衛生署 核准適應症	BELVIQ 是血清素 5-HT2c 受體致效劑，對成人身體質量指數(BMI)過高者於飲食和運動控制後之長期體重輔助管理。適用之身體質量指數為：(1) $BMI \geq 30 \text{ kg/m}^2$ 或 (2) $BMI \geq 27 \text{ kg/m}^2$ 且有一項與體重相關之疾病 (例如：高血壓、血脂異常或第二型糖尿病)。		
用法用量	建議劑量為一天兩次，早、晚各服用一錠，不可超過建議劑量。BELVIQ 可單獨服用，亦可與食物併服。使用達 12 週時，需進行療效的評估，如果體重減少未超過 5%，則建議停止服用 BELVIQ。		
可能的副作用	血清素症候群或精神病藥物惡性症候群、心臟瓣膜疾病、認知損傷、精神疾病、低血糖、心跳速率降低、血液檢查數值改變、泌乳素升高等。		
用藥注意事項	1. 懷孕婦女禁用 BELVIQ 2. 如為輕度的腎功能損傷，則無須調整 BELVIQ 劑量；如為中度的腎功能損傷，則必需謹慎使用 BELVIQ。不建議重度腎功能損傷或末期腎病患者使用 BELVIQ 3. 如為輕度的肝功能損傷 (Child-Pugh score 5-6)，或中度的肝功能損傷 (Child-Pugh score 7-9)，則無須調整 BELVIQ 劑量。目前尚未研究重度肝功能損傷對 Lorcaserin 的影響，故此類患者須謹慎使用		
特殊使用注意事項	自費品項、以盒計價、一盒 60 顆。 藥品進用後刪除 Xenical® (Orlistat;120mg/cap)		
藥品圖樣			

公 告

編號：1070513

新進藥品

藥品英文名	Alvolon		
藥品中文名	艾歐復隆膜衣錠		
主成分名	Diosmin 500mg		
藥品代碼	29D001	廠牌 / 代理商	美時
衛生署 核准適應症	慢性靜脈功能不全之改善症狀(腿部疼痛與水腫)、改善痔瘡症狀。		
用法用量	每日建議劑量為 2 錠 (1 錠午餐時服用，1 錠晚餐時服用)。 急性痔瘡發作：每日建議劑量為前 4 日每日 3 次，每次 1 錠，接下來 3 日期間為每日 2 次，每次 1 錠。		
可能的副作用	噁心、嘔吐、腹瀉、消化不良		
用藥注意事項	1. 本品含 Lactose monohydrate，具有乳糖不耐症，乳糖酶 (Lapp Lactase deficiency) 缺乏或葡萄糖 (Glucose) 及半乳糖 (galactose) 吸收不良的病人，不應服用本品。 2. 本品用於治療痔瘡急性發作建議短期使用，症狀若未緩解，應重新評估治療方式。		
特殊使用注意事項	自費品項、以盒計價、一盒 30 顆。		
藥品圖樣			

藥劑部藥管組 107.05.31