

17c017(9912)



永豐藥品

4-129-37-5(6)

鈣克康[®] 靜脈注射液

CALGLON[®] IV. Injection 10 % (Calcium gluconate)

本品之作用與其他鈣劑相同，惟並無氯化鈣注射液行靜脈注射時若漏液於靜脈外，易引起炎症、浸潤、硬結、壞疽等之副作用。

成份	每 ml 含有:
	Calcium gluconate..... 100.0 mg
	Calcium d-saccharate..... 3.5 mg

適應症	骨形成不全、出血、血清病、氣管支氣管氣喘痙攣性因素、皮膚疾患。
-----	---------------------------------

用法用量	靜脈注射。 成人—每次 10 ml，每日或隔日注射一次。 小孩—每次 2~5 ml。 對鈣劑過敏、發熱或衰弱之患者，應從 5 ml 始用。 本藥限由醫師使用。
------	---

儲存條件	儲存於 25°C
------	----------

注意事項	本品與酒精混合會析出沉澱，故注射器如使用酒精消毒時，須俟酒精揮發完全後使用。 本品注射時，須保持澄清狀態，方可使用。 本品遇有結晶析出時，應先溫熱使之溶解澄清後，方可使用。
------	--

包裝	安瓿 10ml / 100 支以下裝。 小瓶 10ml，50ml，100ml / 100 支以下裝。 內衛藥製字第 005199 號
----	--

永豐化學工業股份有限公司委託
YF CHEMICAL CORP.
台北縣新莊市新樹路 292 號
利達製藥股份有限公司製造
台中縣大甲鎮 437 中山路一段 906 號