



永豐藥品

179081

4-204-37-5(2)

"永豐" 葡萄糖 50% 注射液

GLUCOSE Injection 50% "YF"

成 分 Each ml contains : Dextrose
50% 500mg

效 能 因罹急性傳染病等缺乏水份時，因出血過多致營養失調，因有持久的營養障礙。

用法用量 20% ~ 50% Glucose 注射液
在能量補給之必要時。通常成人每次靜注約 20-500ml，點滴靜注之速度宜保持在每小時每公斤體重注射 0.5 以下。
依症狀適宜增減之。
本藥限由醫師使用。

注意事項 高張液之靜脈內注射須緩慢，如用大量宜預先以溫水加熱至體溫（攝氏 37 度或華氏 98 度）然後注射之。

心臟肥大、心肌衰弱並有血液循環障礙之患者如需用靜脈內注射時，宜先瀉血或抽出與注射量相等之血液，然後注射本液。
重症糖尿病患者須要細心注意。

取用時：

(1) 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

(2) 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

輸液套選用及插入法：

(1) 請依輸液套使用方法正確使用。

(2) 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

(3) 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包 裝 安 瓶 20ml/100 支以下盒裝。
玻 璃 瓶 500ml，1000ml/100 支以下裝。
塑 膠 軟 袋 500ml，1000ml/100 支以下裝。
內衛藥製字第 004135 號

永豐化學工業股份有限公司

Y F CHEMICAL CORP.

台北縣新莊市新樹路292號