

“景德”

德可信 膠囊〈力克沙西林〉

DICLOCIN Capsules (Dicloxacillin)

"Kingdom"

【成分】本品每粒中主含：

Dicloxacillin sodium eq to Dicloxacillin.....250mg (力價)

【作用】

1. Dicloxacillin可抵制青黴素酶之破壞作用，對於大多數革蘭氏陽性球菌，包括 β -hemolytic streptococci, pneumococci和susceptible Staphylococci皆屬有效。
2. 本品於酸性液中安定，在腸胃道中吸收良好，口服後經過1-2小時後即可達血中最高濃度，此濃度較之其他可口服之青黴素製劑為高。
3. 口服後約有70%之本品經由尿中排泄之。
4. 其副作用與其他青黴素製劑相同。
5. 口服後各臟器之分布以肝臟為最高，其次則為脾臟、腎臟、肺部、腦、心臟，亦能分布至胆汁，脊髓液，羊水及乳汁中。

【適應症】

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

【效能】

1. 細菌性心內膜炎、敗血症。
2. 咽頭炎、喉頭炎、扁桃腺炎、支氣管炎。
3. 猩紅熱。
4. 膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、前列腺炎。
5. 淋巴管炎、淋巴結炎、乳腺炎、關節炎、骨髓炎、疳疔。

細菌引起之感染症。

【效能】

- 1.細菌性心內膜炎、敗血症。
- 2.咽頭炎、喉頭炎、扁桃腺炎、支氣管炎。
- 3.猩紅熱。
- 4.膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、前列腺炎。
- 5.淋巴管炎、淋巴節炎、乳腺炎、關節炎、骨髓炎、腹膜炎。
- 6.蜂窩織炎、毛囊炎、丹毒。
- 7.淋病、梅毒。
- 8.子宮內感染。
- 9.外耳炎、中耳炎。
- 10.胆管炎、肝膿瘍。
- 11.創傷、燙傷、手術後第二次感染。

【用法用量】

口服：輕度至中度感染，成人及40公斤以上小孩一次125mg，40公斤以下小孩12.5mg/公斤/日，一日4次。

嚴重感染時，成人及40公斤以上小孩一次250mg，40公斤以下小孩25mg/公斤/日，一日4次。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.對青黴素有過敏症患者禁止使用。
- 2.對Cephalosporins有過敏症者，本人或其血親(雙親、兄弟、姊妹)易起蕁麻疹，支氣管氣喘過敏反應者，及腎障礙者均需慎重使用。
- 3.肝臟:偶有SGOT值上昇。
- 4.間有下痢、噁心、食慾不振等現象。
- 5.長期使用，應定期做腎臟、肝臟和血液的檢查。

【儲存】請保存於乾燥陰涼處（15℃-30℃）。

【包裝】100粒500粒1000粒瓶裝。
100粒鋁箔盒裝。

衛署藥製字第021213號

委託者: 景德製藥股份有限公司

台北縣土城市中央路二段104號

製造廠: 榮民製藥股份有限公司

中壢市中山東路三段447號

40417070①