



## 廣效性抗黴菌劑

### 永克黴<sup>®</sup>錠 200公絲(克多可那挫)

YUCOMY<sup>®</sup> Tablets 200mg(Ketoconazole)

衛署藥製字第 029730 號

癬，即為黴菌感染所引起的皮膚病，其好發於天熱、多汗或潮溼的季節。依癬所生長的部位，可將之命名為頭癬、鬚癬、股癬、足癬（香港腳）、手癬、甲癬等。目前市面上治療藥物的種類多得不勝枚舉，因此選用一種適合患者使用之抗黴菌劑，便相形更加困難，藥性太弱，效果不佳；藥性太強或添加皮質類固醇又會導致身體或皮膚的受損，故理想抗黴菌劑之選擇仍應視患處部位、型態、及嚴重性而定。

本藥含抗黴活性成分 Ketoconazole，可以口服方式治療令患者困擾之表層及深層黴菌感染症，口服本藥更可免除患者因大量塗抹外用藥膏所造成之不便。

「成分」每錠中含：

Ketoconazole 200mg

「作用」：

1. 本藥抗黴菌範圍廣泛，對一般表在性及深部黴菌感染症，如汗斑、灰指甲、香港腳、念珠菌症或隱球菌症等皆有優越的治療效果。
2. 本藥以口服代替外用藥膏塗抹，既方便又簡單，每日 1 錠，即可達最佳效果。

「適應症」：

髮癬 (Tinea Capitis) 、汗斑。

「用法・用量」：

1. 念珠菌陰道炎：早晚各 1 錠，飯食中服用，連續服用 3~5 天。
2. 其他感染：每日 1 錠，飯食中服用，直到病症解除為止；必要時劑量可加倍。  
兒童劑量則每日按 3~5mg/kg。

本藥須由醫師處方使用。

「禁忌症」：

急、慢性肝病患者或已知對本藥過敏者不得使用本藥。

時劑量可有。

「注意事項」：

1. Ketoconazole 慢性治療時，應告知病人有關肝疾病之症狀如異常疲勞且發燒、尿液顏色加深、糞便變白或黃膽。如出現上述症狀，應立即告知醫師。
2. 以下因素可能提高肝炎之危險性：50 歲以上婦女、曾有肝病病史者、不具耐藥力、長期持續治療和同時接受其他影響肝臟功能藥物治療者。

轉氨酶或鹼性磷酸酶可能會有暫時性的提高。此作用不具症狀且對人體無害，故不須停止治療，但此類病人應注意追蹤。

3. Ketoconazole 治療持續達二週以上者應接受肝功能檢驗（治療、服藥二週及其後每隔一個月）。如檢驗結果確有肝病，則須中止治療。

4. 實驗證實每日口服 Ketoconazole 400mg 以上將降低腎上腺皮質刺激素對皮質所產生的反應。因此腎上腺功能不全或長期處於壓力狀態（如手術、特別加護）患者應檢測腎上腺功能。

5. 應和食物一起服用以獲致最佳吸收效果。

6. 避免同時服用副交感神經拮抗劑、制酸劑和 H2 拮抗劑等抑制胃液分泌的藥品，如必須同時服用此類藥品時，應於服藥兩小時後才服用。

7. 胃酸缺乏患者服用時，應每錠溶於四毫升 0.2N 鹽酸中，並用吸管飲用以避免和牙齒接觸，服用後再喝一杯水。

「孕婦、授乳婦之投與」：

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因

此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

「新生兒、乳兒之投與」

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

「使用後之注意」：

本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

「副作用」：

極罕見首次服藥後發生非防禦性休克的病例。曾有數個發生過敏反應包括蕁麻疹的病例。然而，最常見的副作用為噁心和／或嘔吐，發生率約為 3%，腹部疼痛有 1.2%，搔癢有 1.5%，且不到 1% 的病人發生下列副作用：頭痛、暈眩、嗜眠、發熱及寒顫、畏光、腹瀉、女樣男乳、陽痿、血小板減少、白血球減少、溶血性貧血及齒門突出。藥量超過現今核准劑量的研究中，曾有精子過少的報告。每日劑量高達 400 公絲時未曾有精子過少的報告，然而服用此劑量的病人極少測量其精子數。這些副作用大部分為輕度、暫時性的，極罕見須停用本藥品。相較之下。極少發生的肝功能異常則須特別留意。Ketoconazole 的全球性上市後使用經驗罕有禿髮、感覺異常及顱內壓增加包括齒門突出及視乳頭水腫的徵象。高三酸甘油脂血亦曾被報告過，但其與 Ketoconazole 錠的因果關係則尚未確定。

神經精神病異常，包括自殺傾向及嚴重抑鬱，極少發生於服用 Ketoconazole 的病人。

同時併用 Terfenadine 反 Ketoconazole 曾發生心室節律異常(QT 波延長)。研究報告指出 Ketoconazole 與 Cisapride 同時給藥會造成 QT 波延長且極少與心室節律異常具相關性。

「保存上之注意」：

1. 本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。

2. 室溫(15~30°C)、避光儲存。

3. 請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

治療皮膚癬症之五人原則：

a. 保持患部乾爽，避免過度流汗或運動。

b. 避免穿著過度緊身之衣物。

c. 少吃辛辣或刺激性食物。

d. 禁止搔抓患處，必要時可將患處包紮或施行冰敷止癢。

e. 按時正確的使用抗黴菌劑。

f. 治療必須兼具耐心及恆心。

「包裝」：

4~1000's 玻璃瓶、塑膠瓶、鋁箔盒裝。

**永信藥品工業股份有限公司**

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台灣省台中縣大甲鎮中山路 1 段 1191 號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台灣省台中縣大甲鎮曰南里工九路 27 號