

# “優良” 優力黴素口服懸液用顆粒 (賜福力欣)

## ULEX FOR ORAL SUSPENSION (CEPHALEXIN)

優力黴素 (Cephalexin monohydrate) 是一種口服半合成的廣效殺菌性頭芽孢菌素 (Cephalosporin) 抗生素，它的化學結構式是 7- (D- $\alpha$ -amino- $\alpha$ -phenylacetamido)-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid monohydrate.

### 藥 理：

優力黴素在酸中很安定，所以在飯前或飯後服藥都不影響藥效，而且口服後吸收很快。如果服用250mg及500mg的劑量，一小時後可以測得的平均最高血中濃度，分別是9mcg/ml及18mcg/ml，服用六小時以後，仍舊可以測得顯著的血中濃度，服用後八小時內，已經有90%以上的優力黴素以原形式未受破壞，由尿中排出。如果服用250mg的劑量，在這八小時內的尿中，最高濃度可達到1,000mcg/ml。

### 作 用：

優力黴素對下列有感受性的細菌，所引起的呼吸道、生殖泌尿道、骨骼、皮膚及軟組織等感染有治療的效果。

乙種溶血性鏈球菌 (Beta-hemolytic Streptococci)。

葡萄球菌 (Staphylococci) 包括凝固酶陽性 (Coagulase-Positive) 凝固酶陰性 (Coagulase-Negative)，以及產生青黴素酶 (Penicillinase-Producing) 之菌株。

肺炎雙球菌 (Diplococcus pneumoniae)。

大腸桿菌 (Escherichia coli)。

奇異變形桿菌 (Proteus mirabilis)。

克雷白氏菌屬 (Klebsiella sp.)。

流行性感嗜血桿菌 (Hemophilus influenzae)。

卡他性奈瑟菌 (Neisseria catarrhalis)。

### 適 應 症：

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

### 劑 量：

成人——每日劑量1至4Gm，分次服用，普通感染，成人劑量每六小時服用250mg，對較嚴重的感染，則需較高劑量。

兒童——每日劑量為每公斤體重25~50mg，分四次服用，嚴重感染時劑量可加倍。

### 優力黴素 每日劑量

	一般感染	嚴重感染
成人及兒童體重 超過25公斤者	每六小時 250mg	每六小時 500mg至1gm
兒童體重在25公斤 以下者	照體重每公斤每日 25~50mg，分四 次服用。	照體重每公斤每日 50~100mg，分四 次服用。

優力黴素懸浮液  
劑量簡列表

兒童體重	125 mg/5 cc 茶匙
10 公斤	半至 1 茶匙，每日四次。
20 公斤	1 至 2 茶匙，每日四次。
40 公斤	2 至 4 茶匙，每日四次。

用法：

本劑服用時，每 3 公克須加純水至 5 ml，搖勻後使用，溶解後請儲存於冰箱中，並於二星期內服用完畢。

副作用：

胃腸道——曾有腹瀉、噁心、嘔吐、消化不良及腹痛的報告，但均不致於達到須要停藥的程度。  
過敏性——曾發生紅疹、蕁麻疹及血管性水腫的過敏症狀。但停藥後，症狀可自然消退。其他反應包括生殖器及肛門搔癢，生殖器念珠狀菌病 (Genitalmoniliasis)、陰道炎及陰道異常分泌，眩暈、疲勞及頭痛，也曾有嗜伊紅性白血球增多症 (Eosinophilia)，嗜中性白血球減少症 (Neutropenia) 及 SGOT 和 SGPT 輕微增高的報告。

注意事項：

1. 對青黴素過敏的患者，使用頭芽孢菌素時，應特別小心，因為青黴素族與頭芽孢菌素族間可能具有部份交互過敏的性質 (Cross-allergenicity)。
2. 如對優力黴素發生過敏反應，應該停止用藥，並以一般藥物 (如腎上腺素或其他加壓胺，抗組織胺，或腎上腺皮質類固醇) 治療之。
3. 治療期間，如果發生再感染 (Superinfection) 時，應該採取適當措施。
4. 腎功能有顯著損傷的患者，其安全劑量，可能比一般建議劑量低。所以使用本劑時，應該配合仔細的臨床觀察。
5. 孕婦使用本劑的安全性尚未確定。
6. 使用本劑後，如果採用 Benedict 氏液，Fehling 氏液或 Clinitest 片法檢驗尿糖，可能獲得葡萄糖的假陽性反應。
7. 接受 Cephalosporin 治療期間，可能使直接 Combs 試驗得到陽性反應，母親在生產前若曾接受 Cephalosporin 的治療，而初生嬰兒又有直接 Combs 試驗的陽性反應，這反應被認為是由 Cephalosporin 所引起的。

本藥須由醫師處方使用。

包裝：

優力黴素口服懸液用顆粒，每 3 公克含 Cephalexin monohydrate 相當於 125 mg 之 Cephalexin base。

18 Gm，36 Gm，300 Gm，600 Gm，1,000 Gm 瓶裝。

衛署藥製字第 17280 號

優良化學製藥股份有限公司

台灣省桃園縣中壢市東園路十七號