

「瑞德」 依普芬懸液劑 20公絲/公撮

Ibuprofen Oral Suspension 20mg/ml

GMP
衛署藥製字第 G-6783 號
043152

每毫升含：

Ibuprofen20.0 mg

藥理作用：

1. Ibuprofen 作用機轉：抑制前列腺素(Prostaglandin)之合成而具消炎、鎮痛、解熱之效應。
2. Ibuprofen 口服吸收快，約一小時最高血中濃度，藥效迅速。
3. Ibuprofen 半衰期約 2 小時，70%經尿液排泄。
4. Ibuprofen 為一非比林系，非類固醇(NSAID)之消炎、鎮痛、解熱劑。

適應症：

一般疼痛之緩解及解熱、關節炎輕度疼痛之緩解。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

嬰幼兒：6 個月到 12 歲：體溫 39°C 以下，每公斤服 0.25ML，每 6~8 小時一次。

體溫 39°C 以下，每公斤服 0.5ML，每 6~8 小時一次。

一天每公斤最大服用量為 2ML。

幼年型關節炎：每公斤每天 1.5~2ML，分 3~4 次服用。

成人：發燒：每次 20ML，每 4~6 小時一次。

月經痛：每次 20ML，每 4~6 小時一次，必要時每 4 小時一次。

風濕性關節炎：每 15~40ML，每天 3~4 次。

注意事項：

1. 長期用藥時，須作定期臨床檢查，如異常則須減量或停藥。
2. 本藥可能會遮避感染症狀之顯現，因此用於治療感染引起之炎症時，必須合併使用適當之抗菌劑，並仔細觀察慎重投與。
3. 避免與其他消炎鎮痛劑併用。
4. 對小兒及高齡患者尤須注意是否有副作用出現，並以最低之有效劑量慎重投藥。
5. 對主成份過敏者禁用。
6. 嚴重高血壓，嚴重心機能不全者禁用。
7. 消化性潰瘍、嚴重血液異常，嚴重肝、腎障礙者禁用。
8. 支氣管氣喘者小心用藥。
9. 使用前搖勻。

副作用：

1. 消化性器官：可能有腸胃出血，亦可能有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快等現象，或出現口內炎、便秘等症狀。
2. 神經系統：頭痛、暈眩、緊張等。
3. 心血管：會有水腫現象，高血壓患者應小心使用。
4. 肝臟：可能出現黃膽及 Transaminase 值異常現象。
5. 偶有視覺異常或出現耳鳴的症狀。
6. 血液：可能引起再生不良性貧血、顆粒白血球缺乏症、血小板減少等血液障礙，故須作血液檢查並小心觀察，如有異狀出現須立即停藥。
7. 過敏症：有時可能會有 Stevens-Johnson 症狀出現(發熱、皮膚黏膜發疹、紅斑、壞死性結膜炎)Lyell's 症狀(中毒表皮壞死症)、發疹或誘發氣喘等症狀，遇此症狀立即停藥。

包裝：15~4000 公撮塑膠瓶裝

貯存：

(1)本品應置於孩童伸手不及處。

(2)請密封避光貯存於陰涼處。

製造廠：

晟德大藥廠股份有限公司 新竹廠

CENTER LABORATORIES INC.

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 2 號

公司電話：(02) 2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562

工廠電話：(03) 598-1829 圖文傳真：(03) 598-1820

委託者：

瑞德生技股份有限公司

台北市內湖區文德路 22 巷 9 弄 38 號 1 樓