

鎮痛劑

## 散痛舒錠

SEDES TABLETS

…… 組成及性狀 ……

散痛舒錠：白色錠劑，味苦。

錠劑 1 錠中所含成份如下：

Isopropylantipyrine	75mg
Allylisopropylacetylurea	30mg
Acetaminophen	125mg
Caffeine Anhydrous	25mg

…… 作 用 ……

〔藥理作用〕

1. Allylisopropylacetylurea 是緩和之鎮靜催眠劑，可消除疼痛所致之不安或緊張，與鎮痛劑合用則其作用增強。
2. Isopropylantipyrine (Pyrazolone 系解熱鎮痛劑) 與 Acetaminophen (Aminophenol 系解熱鎮痛劑) 配合，其鎮痛作用加強，急性毒性則相抵制而減弱。
3. Caffeine 之中樞神經興奮作用，促進精神機能活化，心情爽快，並對血管性頭痛，可使腦血管收縮而顯示鎮痛作用。

〔毒 性〕

急性毒性LD<sub>50</sub>：1,244.6mg (小白鼠，口服)

1,773.5mg (大白鼠，口服)

…… 適 應 症 ……

鎮痛解熱 (頭痛、牙痛、月經痛、風濕痛、關節痛、肌肉痛、神經痛等之緩解。)

…… 用法及用量 ……

本藥須由醫師處方使用

通常成人 1 次 2 錠 1 日 3 次口服。劇痛時頓服 2~4 錠，如欲追加，至少須間隔 4 小時以上，且一日劑量不可超過 6 錠。

宜視年齡、疾病症狀而酌量增減，但不可超過上述之最大劑量。

…… 注意 事項 ……

1. 本劑易引起危險性之顆粒性白血球缺乏病 (Agranulocytosis)，應經醫師優先考慮其他毒性較低之藥品後認為確有必要時方可使用，使用期間愈短愈好，並應常作白血球及其分類計數，遇有計數改變或有喉痛、口咽喉部之感染 (喉痛、腫脹、鰐潰瘍) 等徵兆時應即停用。
2. 如有下列情事者不宜使用：
  - a. 本人或血親有蕁麻疹、斑疹、支氣管性氣喘、過敏性鼻炎、偏頭痛、食物過敏性等病患者。
  - b. 過去曾因用藥而引起發熱、發疹、關節痛、氣喘、搔癢等過敏症狀者。
  - c. 久病、體弱或發高燒者。
  - d. 孕婦及可能懷孕之婦人。
  - e. 就診前曾使用其他感冒、解熱、鎮痛、鎮咳、祛痰劑等藥物者。
3. 應用本劑數次仍未見症狀改善時應即停用。
4. 避免長期服用。
5. 本劑應置於小孩伸手不及處。

…… 儲 存 方 式 ……

儲存於室溫

…… 包 裝 ……

錠劑 12~1000 錠鋁箔盒裝及塑膠瓶裝

衛署藥製字第 028374 號

®：註冊商標 (日本 塩野義製藥株式会社授權使用)

台灣塩野義製藥股份有限公司

公司地址：台北市南京東路二段二號 4 F

電話：(02) 二五五一六三三六 (代表號)

工廠地址：基隆市七堵區六堵里工建西路五號

電話：(02) 二四五一二四六六 (代表號)