

富鐵好滴劑

Ferrum Hausmann® Drops

衛署藥輸字第022368號

本藥須由醫師處方使用

組成

每一毫升(20滴)滴劑中含有50毫克以氫氧化三鐵之聚麥芽糖複合物Iron(III)-Hydroxide Polymaltose Complex (IPC) 型式存在的鐵、香料、蔗糖、防腐劑(E217,E219)和助溶劑。

性質

藥理作用：抗貧血

富鐵好滴劑是一種鐵製劑用來治療潛伏性鐵缺乏症和缺鐵性貧血。鐵是血色素、肌紅蛋白和含鐵酵素的重要組成。鐵缺乏症的治療，對一歲以內的新生兒尤其重要。在這個年齡發生的鐵缺乏症會對腦部發育造成傷害。一般而言，鐵缺乏症會導致慢性疲倦、注意力無法集中、易怒、焦急、頭痛、食慾喪失、壓力敏感、易受感染、蒼白、嘴角破裂、皮膚乾燥、脆弱的頭髮和指甲、失去跟小朋友遊戲的興趣。

富鐵好滴劑所含的鐵是以氫氧化三鐵之複合物存在，每一個獨立粒子包埋於一種碳水化合物聚合體中(聚麥芽糖)。這種特殊機制可以防止鐵對胃腸道系統造成任何傷害，也防止鐵與食物發生交互作用，甚至它也確保了鐵的生體可用率。

IPC的結構與鐵蛋白類似，鐵蛋白是自然界存在的貯鐵蛋白。基於這個相似性，富鐵好滴劑所含的鐵乃經由自然生理的作用機轉進行吸收。IPC也不像亞鐵鹽具易氧化特性。

適應症

缺鐵性貧血。

劑量

本藥須由醫師處方使用

成人：每次20滴，每天2~3次，飯後服用。

小孩：每次20滴，每天1~2次，飯後服用。

嬰兒：剛開始每天6滴，而後慢慢增加到每日20滴。

富鐵好滴劑可與果汁、蔬菜汁或其他飲料混合使用。

請給予適當的劑量並定期服用，治療期間至少須維持1~2個月。

投予方法

每日劑量可分成數次或一次投予。富鐵好滴劑須在餐中或餐後立刻服用。

富鐵好滴劑可攪入果汁、蔬菜汁或牛奶中一起服用。加入飲料後造成輕微的變色不會改變口味或療效。

禁忌

鐵過度負荷(例如血色素沈著病、血鐵質沈著)或鐵質利用失常(例如鉛中毒性貧血、鐵質利用不良性貧血、地中海型貧血)和非鐵缺乏症引起的貧血(例如溶血性貧血)。

已知對任何相關成分耐受不良。

警語和注意事項

糖尿病病患：每毫升(20滴)相當於0.01單位麵包。

感染或惡性腫瘤引起的貧血病患：外來替代的鐵會被儲存於網狀內皮系統，只有當原發性疾病痊癒後鐵才會被代謝利用。

交互作用

至今尚未有交互作用報告。因為富鐵好滴劑的鐵是複合物，所以不會和食物中的組成(植酸鹽、草酸鹽、鞣酸等)及併藥劑(四環黴素、制酸劑)發生離子性交互作用。

檢驗是否有潛血反應的潛血試驗(對血紅素有專一性)，服用富鐵好滴劑並不會造成影響，因此不需要中斷鐵劑治療。

懷孕和哺乳

動物的生殖試驗未發現對胎兒有害。針對懷孕第一期後婦女進行控制試驗，也未發現任何對母體和胎兒之不良反應。無證據顯示對懷孕第一期會造成危險而且對胎兒也無負面影響。服用富鐵好滴劑對正在接受哺乳的兒童殆無不良影響。

在懷孕和哺乳期間，服用富鐵好滴劑前須先徵詢過醫師或藥師之同意。

不良反應

服用富鐵好滴劑後副作用發生率極低，可能的副作用：便秘、下痢、噁心、腹部疼痛、胃部不適、消化不良、嘔吐、皮疹(蕁麻疹、疹、搔癢)。

排黑便是鐵排除所造成的正常現象。富鐵好滴劑不會著色於牙齒。

過量

至目前為止尚未有中毒或鐵過度負荷的案例。

儲存

25°C以下保存於原容器。

包裝

30毫升玻璃滴瓶裝。

製造廠：

Vifor S.A.

Route de Moncor 10 CH-1752 Villars-Sur-Glane, Switzerland

藥商：

弘如洋生技股份有限公司

台北市中山區南京東路二段88號10F