

# "培力" 佑汝膠囊 2.5 毫克

## Gestrin Capsule 2.5 mg "P.L."

276064  
(100,06)

衛署藥製字第047913號 GMP G-9055

- 【成份】每顆含有Gestrinone 2.5 mg
- 【適應症】子宮內膜異位
- 【說明】本品為一合成之類固醇荷爾蒙，具有抗黃體脂酮性質，可治療子宮內膜異位。
- 【用法用量】

1. 本藥須由醫師處方使用。
2. 本藥一般用量為每週二次，每次服用一顆。於月經週期第一天服用第一顆，三天後服用第二顆，此後，固定於每週的相同二天，且最好於相同時間服用本藥。
3. 如果忘記服藥一次，則於發覺時立即服用，並持續每週二次服藥。如果忘記二次或更多次，則立即停止服藥並告知醫師。如果誤服過多劑量，應立即告知醫師。

### 【注意事項】

1. 若有下列情形請勿服用本藥：
  - \* 懷孕或打算懷孕
  - \* 哺乳嬰兒期間
  - \* 患有心臟、腎臟或肝臟疾病
  - \* 曾接受荷爾蒙類藥物治療，包括服用避孕藥，而曾有不適症狀者
2. 應告知醫師所有正在服用之藥物，包括自行購買的藥物，因為某些藥物，包括避孕藥、治療癲癇及結核病的藥品，可能會干擾本品的作用。若有必要醫師可修改處方。
3. 本藥不是避孕藥，不可作為避孕用途。如欲避孕者於治療期間應避孕（但不可服用口服避孕藥）。

### 【副作用】

1. 任何治療方式都可能副作用。本藥的副作用可能包括皮膚產生斑點、粉刺及油膩、體重增加、食慾改變、熱潮紅、頭痛、痙攣、神經過敏、抑鬱及腸胃不適，也有一些患者有性慾、乳房大小、聲音等改變及體重增加的報告。
2. 若發覺對本藥有不適反應或有任何問題，應與醫師或藥師討論。

【儲存】25°C以下密封避光儲存，並應置於孩童不易觸及處。

【包裝】2~1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝

Code No:GSP2.5



培力藥品工業股份有限公司

台中市407工業區六路十一號 台灣省

電話：(04)23592576 (代表號)

傳真：(04)23590992

# 病患使用須知

服用藥物前請先仔細閱讀此病患使用須知這份病患使用須知只是概括性的說明，關於此藥品的資料相當多，無法一一登載於此份須知上；假如妳對此藥有任何疑問，或是妳想知道更多相關的資訊，請詢問妳的醫師或藥師，他們可以提供妳更多有關於此藥物的資訊。

請將此份病患使用須知保存下來，日後也許妳會想再重新閱讀一次。

## 妳吃的“培力”佑汝膠囊是甚麼？

“培力”佑汝膠囊須經由醫師處方開出的處方藥，是一種口服治療子宮內膜異位症之藥物。每顆膠囊含有主成份Gestrinone 2.5 mg，另外含其他賦形劑。Gestrinone是一種合成的荷爾蒙，具有抗黃體激素的效果。此荷爾蒙製劑並非避孕藥，所以不可以當作避孕藥使用；服用此藥期間，必須做好相關的避孕措施（須排除服用避孕藥避孕），所以服用此藥前，請與妳的醫師討論相關的避孕措施。

## 妳適合服用這個藥嗎？

服用藥物前，請先閱讀下列文字，假如以下任一項，妳的回答為“是”的話，請妳一定要告知妳的醫師。

- \* 妳對此藥物的成份曾經有過不良反應或過敏嗎？
- \* 妳正計劃懷孕或已經懷孕嗎？
- \* 妳正在哺乳嗎？
- \* 妳有心臟、腎臟或肝臟方面的疾病嗎？
- \* 妳以前曾經接受荷爾蒙相關的治療（包括服用避孕藥丸）嗎？如果有，妳對荷爾蒙相關的治療有任何不適嗎？
- \* 妳現在有在服用任何口服避孕藥嗎？
- \* 妳是糖尿病患嗎？

## 妳有服用任何其他藥物嗎？

請告知醫師妳正在服用的任何藥物，包括妳自行購買的非處方藥物，這是非常重要的。因為某些藥物，包括避孕藥、抗癲癇藥物、結核病藥物(Rifampicin)等會與Gestrinone

產生交互作用，醫師知道情況並權衡利弊後，會做出最適當的決定。

## 妳該如何服用佑汝膠囊呢？

假如醫師指示妳服用此藥，那正確的服藥方式是非常重要的。通常，妳只需要一個星期服用二次，第一顆藥物在月經周期的第一天服用，三天後再服用第2顆藥物，從此以後，每個星期的相同二天服用佑汝膠囊直到療程結束，通常需要持續服用6個月，若有其他不清楚的地方，請詢問藥師或衛教人員。

## 假如忘記服藥怎麼辦？

當妳想起來的時候趕緊服用一顆佑汝膠囊，然後繼續每週二次用藥；假使妳忘記服藥超過二次，停止用藥並詢問妳的醫師。

## 假如服用過多藥物該怎麼辦？

假如妳不小心服用過多藥物，請馬上聯絡妳的醫師或藥師。

## 關於副作用：

任何治療都可能發生副作用，佑汝膠囊可能的副作用包括點狀出血，痤瘡、皮膚油膩，體重增加、食慾改變、掉頭髮、潮紅、頭痛、關節疼痛、痙攣、神經質、情緒低落及胃部不舒服（便秘、腹瀉）。

某些研究或文獻指出，少部分人會發生性慾、乳房大小及聲音改變或體毛增加，另外也有可能會有肝功能指數異常、增加體液滯留、水腫及感覺腫脹等。

假如妳覺得藥物引起的反應相當不適，請將症狀與妳的醫師或藥師討論。

## 妳該如何儲存妳的藥物？

將藥物避光儲存在25°C以下，若藥物已過期，請勿服用。

不可將藥品放在小孩拿得到的地方。

假如妳的醫師告知妳停止治療，請將剩餘的藥物拿回給藥師。

謹記，此藥只有在醫師處方下才可使用，請不要將此藥拿給他人使用，縱使她的症狀與妳相同。