

優福尼爾-愛斯 膜衣錠

Spasmo-Euvernil[®] F.C. Tablet

285016 (100.04)

GMP
040656 號
G-4169
衛署藥製字第

主成份：每膜衣錠中含有

Sulphaurea(Sulfascarbamide) (抗菌有效成分).....500 mg
Phenazopyridine Hydrochloride (止痛成分).....50 mg

適應症：

尿道炎、膀胱炎、腎盂炎。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人及兒童：每日三次，每次口服一膜衣錠。

學齡以下兒童：每日三次，每次口服一膜衣錠。

服用時，最好以整個膜衣錠吞嚥，不要咀嚼。本膜衣錠呈光滑之細長形，吞食應無困難。

因所含止痛藥成分關係，每日最大量不得超過10膜衣錠。

治療期限：

初次感染為每日服三次，每次兩膜衣錠，連續服十天。

禁忌：(依文獻記載)

凡對磺胺藥有禁忌者，對本品亦然。這些包括：

磺胺藥過敏，多形性滲出性紅斑(及有該病病史者)，具有白血球較少或血小板減少，血球分化之嚴重變化，先天性紅血球葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶(congenital glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency of erythrocytes)缺乏症，科隆型及蘇利世型血紅素不正常(hemoglobin anomalies with Hb Coloque and Hb Zurich)，急性胞體紫質(acute porphyria)。Spasmo Euvernil亦不可用於嚴重腎功能損傷(creatinine清除率小於25ml/min/1.73³)，嚴重肝損傷或肝功能損害(如急性肝炎)。磺胺藥對下列情況亦有禁忌：輕度肝及腎功能損傷，甲狀腺功能損傷，對sulphonyl尿素類抗糖尿病藥及具磺胺基本結構之利尿劑有過敏者，懷孕最後三個月之孕婦、哺乳婦及嬰兒。

藥物不良反應：(依文獻記載)

與其他磺胺藥一樣，以sulphaurea治療應用時，偶或發生下列情況：腸胃不適如噁心、噁吐、腹瀉，進一步的過敏反應如皮疹(蕁麻疹、紅斑、斑點及麻疹樣斑點)，紫斑，對光過敏(光照性皮炎)，結節性紅斑，史蒂文斯-強生症候群(Stevens-Johnson's Syndrome，多形性滲出性紅斑)，李爾氏症候群(Lyell's Syndrome，急性中毒性表皮鬆解)、脫落性皮炎、藥物熱、頭痛及關節痛。膽汁鬱積性肝病(黃膽病)及葉酸缺乏症狀，如貧血和腹瀉。

個別者發生之不良反應有：血液分化性變化(血小板過少症，白血球過少症，粒性白血球缺乏症，嗜伊紅血球缺乏症，再生不能貧血、急性溶血性貧血)，瘀斑性皮膚出血，肝損傷(局限性或彌散性壞死)。有疏血紅素貧血(sulphaemoglobinaemia)變性血紅素貧血(methaemoglobinaemia)引起之發紺(很少由phenazopyridine引起，在一種特殊的血液病時，亦可由磺胺引起)。

Caution注意：

在某些國家Sulphaurea對相關細菌的抵抗力很強。

藥物交互作用：(依文獻記載)

磺胺藥與其他藥物發生之各型藥物交互作用可予以區別。一種可能是因競爭與血漿蛋白之結合，而使其他藥物在血中之濃度發生變化(如抗凝血藥，sulphonyl尿素類口服抗糖尿病藥，diphenylhydantoin, methotrexate)，或使磺胺藥之效力發生改變(probenecid, indomethacin, phenylbutazone, salicylates, sulphinpyrazone)。另外，磺胺藥可與其他藥物發生直接作用。如磺胺藥與抗酸劑合用，可減少磺胺藥之吸收量。與paraldehyde同服，可增加磺胺之新陳代謝速率。與hexamethylene-tetramine(methenamine)合用有產生結晶尿之危險。磺胺藥因與其他藥物競爭作用部位，其作用亦可發生變化。化學結構類似之拮抗藥(如benzocaine, procaine, tetracaine)可減低磺胺藥之作用。Phenazopyridine HCl與硫製劑合用，可導致疏血紅素產生。

注意事項：(依文獻記載)

1. 超過有效期之藥品，不可使用。
2. 將藥品放在小孩拿不到的地方，以免被誤食。
3. 凡使用磺胺藥者，可發生光敏感。

特別留意：(依文獻記載)

服用本藥後尿液呈紅色，常會沾染內褲。以常用之衣物去污劑即洗滌可使紅色褪去。外衣應防護勿沾染尿液。

本品特性：(依文獻記載)

抗菌有效成分 Sulphaurea

所含 Sulphaurea 溶解度大，吸收良好，由腎臟排除快，服藥後 2-3 小時，約有吸收量之半數由腎臟排出，因此無發生在泌尿道出現藥物結晶之危險。

尿道止痛成分：

所含 Phenazopyridine HCl 是效力可靠之尿道止痛劑，在尿中排出之濃度很高，因感染而發生之輸尿管路疼痛及排尿痛苦於服藥後可迅速消失。

對排尿意向有正面的影響。

包裝：12-1000 錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

儲存：

(1) 本品應置於兒童不及之處。

(2) 請密封儲存於 25°C 以下，請勿冰存並避免陽光直射。

委託者：益德大藥廠股份有限公司

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市松山區民權東路三段 189 號 8 樓

製造廠：大豐製藥股份有限公司

廠址：彰化縣彰化市埤子墘頂巷 11 號

服務電話：(02)2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562

CTRA-074 20101001

14S06-A01