



Dihydropyridine 類鈣離子通道 阻斷劑(CCB)藥物使用須知

學名	商品名	中文名	劑量	藥品外觀	藥號
Amlodipine	Norvasc	脈優錠	5mg		24A026
Felodipine	Felpin ER	菲可平持續 釋放膜衣錠	5mg		24F021
Nifedipine	Atanaal	壓達能 軟膠囊	5mg		24N043
	Adapine SRFC	壓悅達持續 性藥效錠	30mg		24N104
Lercanidipine	Zanidip	利壓膜衣錠	10mg		24L081

◎ 作用

治療高血壓。

◎ 用法

請遵照醫師處方服用，未經醫師同意切勿自行調整或停藥。

◎ 注意事項

1. 若您曾對類似藥物過敏者，請勿服用此類藥物。
2. 剛開始服用本類藥品時，可能造成頭暈、目眩、輕微頭痛等情形，因此在站立或走路時應特別小心。
3. 請記錄血壓並定期回診，由醫師評估藥物反應，並進行相關檢查。
4. 服用本藥期間請勿飲酒。若您經常喝葡萄柚汁或吃葡萄柚，請告訴醫師。
5. 若您計畫懷孕或已懷孕，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
6. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物，尤其是心臟血管用藥、抗癲癇藥（如：phenytoin、carbamazepine）、rifampin或cyclosporine等。

◎ 相關副作用

頭痛、暈眩或頭昏眼花、潮紅、盜汗、噁心、嘔吐、鼻塞或流鼻水、水腫等。

◎ 忘記服藥時之處置

若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿一次或短期間服用兩次劑量。

◎ 藥品儲存處置

1. 除非藥品另有標示使用期限外，一般效期為開方期限後三個月。
2. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
3. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線詢問藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

