



男性勃起功能障礙藥物 使用須知

Cialis® 犀利士®

Levitra® 樂威壯®

Viagra® 威而鋼®

中文藥名	主成分	英文藥名	含量	藥品外觀
犀利士	Tadalafil	Cialis®	5mg/錠	
樂威壯	Vardenafil	Levitra®	5mg/錠	
威而鋼	Sildenafil	Viagra®	100mg/錠	

◎ 作用

本類藥物為治療男性勃起功能障礙的藥物，並不能增強性慾。性功能正常的男性不建議使用。

◎ 用法

1. 請遵循醫囑服用本類藥物，每天限服用一次為原則，勿過量。
2. 威而鋼®在您性行為前1小時服用。
3. 樂威壯®在您性行為前1小時服用。
4. 犀利士®在您性行為前30分鐘服用。
3. 服用威而鋼®前，避免吃高脂肪性食物，以免延長威而鋼®的作用。

◎ 注意事項

1. 若您對本類藥物曾有過敏反應或有以下疾病，請告訴您的醫師：
 - (1). 肝腎疾病
 - (2). 胃潰瘍或出血等問題
 - (3). 視網膜炎
 - (4). 心臟疾病如：心臟瓣膜的異常、不規則的心跳、血壓異常、心絞痛（胸痛）、心衰竭等。
 - (5). 血液相關性問題如鎌狀細胞性貧血，血液方面腫瘤如白血病或多發性骨髓癌。
2. 若您正在服用硝酸鹽類藥品如：nitroglycerin（耐絞寧®）；isosorbide（易適倍®）；Imdur（寬心持續性藥效錠®），禁止使用本類藥品。
3. 若您正在服用甲型阻斷劑藥物如：doxazosin（立安錠®、可迅持續性藥效錠®）時，
 - (1). 請不要服用犀利士®或樂威壯®。
 - (2). 若與威而鋼®併服請間隔4小時以上服用。

4. 若您有以下狀況時，請告訴您的醫師：

- ◆ 服用抗愛滋病的藥物（如：ritonavir諾億亞軟膠囊[®]，kaletra快利佳膜衣錠[®]）、抗黴菌感染的藥物（itraconazole易克黴[®]）、抗心不整的藥物（amiodarone臟得樂[®]，quinidine華尼丁[®]）或抗生素（erythromycin紅黴素膠囊[®]）。
- ◆ 同時併服其他降血壓藥物。
- ◆ 最近有發生中風、心臟病發作或者生殖器出現異常的情形。
- ◆ 服用本類藥品後，需受到性刺激，才会有勃起現象；如您服藥後並未改善您的勃起功能障礙，請告訴您的醫師。

5. 請讓任何照顧您的人知道您正在服用本類藥品。

6. 女性或兒童不應服用本類藥品。

7. 本藥並不會防止您受到性病的傳染（如：愛滋病、梅毒），也沒有避孕的作用。

◎ 若您於服藥期間發生下述狀況時請立即回診就醫

- ◆ 過敏反應：如搔癢或紅疹，臉或手部腫脹，嘴唇或喉嚨腫脹或有刺痛感，胸悶，呼吸困難，頭暈。勃起傷害或勃起持續超過4小時，心跳加快，胸痛，異常背痛或肌肉痛，視覺障礙。

◎ 若您於服藥期間發生下述狀況時請告知您的醫師

頭痛，鼻塞，流鼻水，胃部不適，噁心，潮紅（臉部、脖子、手臂、前胸處發熱或發紅）。

◎ 忘記服藥時之處置

本類藥品服用時間為性行為前30~60分鐘服用，若您想起忘記服藥時請儘快補服。以每天服用一次為原則，請勿一次服用兩倍劑量。

◎ 藥品儲存處置

1. 請將藥品存放在室溫中，避免存放於高溫、潮濕或直接日曬的地方。
2. 請將藥品放在兒童拿不到的地方，以免幼兒誤服。
3. 請勿未經醫師指示自行服用此類藥物。
4. 不可將本藥與他人分享，以免發生危險。

※若您有使用藥物之相關問題，請洽詢用藥諮詢專線諮詢藥師或您的醫師。

◎ 藥物諮詢信箱：

- 奇美醫院：druginfo@mail.chimei.org.tw
- 柳營奇美醫院：clh5500@mail.chimei.org.tw
- 佳里奇美醫院：cch5500@mail.chimei.org.tw
- 藥物查詢網站：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/drugsearch.htm

奇美醫院：台南市永康區中華路901號

柳營奇美醫院：台南市柳營區太康里太康201號

佳里奇美醫院：台南市佳里區興化里佳里興606號

電話：(06)2812811分機53101-2；53112

電話：(06)6226999分機73101

電話：(06)7263333分機33111



A5500235