


公 告

新進藥品

編號：1100604

藥品英文名	Kocel Powder		
藥品中文名	康纖散劑		
主成分名	每公克含 Psyllium Husk 1g，每包 6 公克		
藥品代碼	26P001	廠牌 / 代理商	昭羿生醫科技有限公司
衛生署 核准適應症	軟便		
用法用量	成人每次 1 包，每天服用 1-3 次。 兒童：6 歲左右約成人劑量的一半或由醫師指示服用。		
可能的副作用	腹脹，腸胃氣脹，腹瀉，噁心，腹痛		
用藥注意事項	1. 每包加入 240ml 冷開水或果汁，充份混和均勻後立即服用，並追加一杯冷開水增加藥效。 2. 使用此藥前後 2 小時內勿服用其他藥。 3. 請勿直接倒入嘴巴以免阻塞食道		
特殊使用注意事項	1. 專案進口藥品，院內庫存僅 1008 包。		
藥品圖樣			

藥劑部藥管組 110.6.29

公 告

新進藥品

編號：1100605

藥品英文名	ArtiAid Plus Intra-articular Injection		
藥品中文名	優節益關節內注射劑		
主成分名	Sodium Hyaluronate 30mg/2ml (2.0mL 1.5% 透明質酸鈉)		
藥品代碼	50A002 衛材代碼 12-148-21520	廠牌 / 代理商	和康生技
衛生署 核准適應症	治療退化性關節炎疼痛患者，限用於保守性非藥物治療及一般鎮痛劑如 (Acetaminophen) 無效時使用。		
用法用量	每周一針，連續三周。 注射本產品時，必須遵守無菌操作過程。若關節腔內有滲出液時，請先以空針將關節液抽出。		
可能的副作用	注射部位疼痛、膝關節腫脹且/或滲液，局部皮膚反應（紅疹、瘀斑）、搔癢等症狀產生。在風濕性關節炎或痛風關節炎病患使用本產品，曾有膝關節注射處發生暫時性發炎反應之回報。		
用藥注意事項	4. 注射本產品後，可能會產生疼痛、腫脹及僵硬等局部副作用，但會逐漸緩解。患者於 48 小時之內需避免負重及劇烈運動。 5. 僅限關節腔內注射。		
藥品圖樣			