

“中國化學”

葡萄糖酸鈣注射液 10% Calcium Gluconate Injection 10%

“C.C.P.C.”

網號：Q60

成分：每毫升中含有：

Calcium gluconate.....96.1mg
(0.465 meq of Ca⁺⁺ per ml provided by Calcium gluconate and Calcium saccharate stabilizers)

作用：補充鈣離子。

適應症：鈣不足引起之手足搐搦、膽囊及輸尿管絞痛、枯草熱、蕁麻疹、妊婦哺乳時之鈣補給。

用法用量：本藥限由醫師使用。

1. 每回 1.83~9.17meq, 1 日 1 回, 每分鐘 0.68~1.36 meq 緩慢靜脈注射；亦可加入 500 毫升之輸注射液，點滴靜注。

2. 200 毫升裝，僅供全靜脈營養輸注射液調配使用。

注意事項：

1. 不得使用於腎不全之低鈣血症患者，毛地黃配醣體正服用之患者。

2. 甲狀腺機能亢進者，應小心使用。

3. 有增強子宮收縮劑之作用。

4. 本注射液與酒精接觸會生沈澱，故待附著於注射器內部之酒精揮發後，方可使用。

5. 本品須保持澄清狀態，方可使用。

6. 200 毫升裝，禁止直接使用於靜脈注射。

7. 本劑含有總鈣量為 0.465 meq/ml，以 Calcium d-saccharate 當本劑的安定劑，其所攜帶的鈣量一併合計於總鈣量中。

8. 取用時：

(1) 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。

(2) 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。

9. 輸液套選用及插入法：

(1) 請依輸液套使用方法正確使用。

(2) 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

(3) 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

10. 因本品為飽和溶液，若遇有結晶析出時，請勿使用。

貯存：室溫(30°C 以下)避光貯存。

包裝：200 毫升玻璃瓶裝，100 支以下盒裝。

賦形劑：

Water for Injection



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

