

# 先泰腸溶膜衣錠 10 公絲(鋸齒酵素)

Enzdase Enteric F.C.Tablets 10mg(Serratiopeptidase)

衛署藥製字第 039719 號

本劑之主成分 Serratiopeptidase 是一種蛋白質分解酵素，具抗炎及抗腫脹作用，有強力的酵素活性，及優異的 Bradykinin 分解作用，能有效的緩解炎症併發的各種症狀，促使組織的復元，因此可以抑制炎症並改善炎症部位的體液循環，進而溶解滯留在炎症病灶的壞死組織及不正常滲出物和膿汁，以利排出。

本劑由於效果良好，且其經口投藥的副作用極微，對炎症及腫脹緩解，以及增強抗生物質效果，均可應用。

「成份」：Each Enteric F.C.Tablet contains：  
Serratiopeptidase 10mg

「適應症」：

手術後及外傷後之消炎、副鼻腔炎、膀胱炎、副睪丸炎、智齒周圍炎、齒槽膿瘍等之消炎、支氣管炎、支氣管氣喘所引起之喀痰困難、麻醉後之喀痰困難。

「作用」：

1. 除去炎症所產生的浮腫、血腫及腫脹。  
能改善手術、外傷及炎症性疾患所併發的炎症部位之體液循環，可分解炎症病灶上所發生的不正常滲出物或已變性的蛋白，使其經由血管、淋巴管將之吸收，去除炎症所併發的浮腫、腫脹及血腫，而緩和炎症症狀。
2. 喀痰、膿汁之溶解，使之易於排出。  
將支氣管炎、支氣管氣喘、麻醉等引起而滯留在氣管、腹腔的粘性分泌物分解使之液化，而促使喀痰及膿汁容易排出。
3. 清淨病灶及促進組織的復元。  
對於手術、創傷、火傷、炎症性患者而引起的病灶及其周圍的膿纖維素，及壞死物質可溶解去除，使之淨化，同時亦促進肉芽組織的新生及病灶之治療。

4. 增強抗生物質的效果

本劑可促進抗生物質對感染病灶的滲透並增強效果。

「用法、用量」：

本藥須由醫師處方使用。

1. 通常 1 天 30mg 分 3 次，每次 1 錠於飯後服用。
2. 本劑為腸溶膜衣錠，故服用時，請勿咬碎，以免造成失效。

「副作用」：

1. 過敏症: 偶有發疹、發紅過敏現象，但很少發生，若有此症狀只要停止服藥即可消失。
2. 消化系統: 偶有下痢、食慾不振、胃部不舒服感、噁心、嘔吐等症狀，但很少發生。

「交互作用」：

與抗凝血劑併用時，會增強抗凝血劑的作用，故應該避免併用，否則必須慎重投與，且小心觀察。

「注意事項」：

1. 血液凝固異常之患者，必須慎重投與。
2. 有嚴重肝、腎障害之患者，也必須慎重投與。
3. 各種細菌感染併發時，應併用抗生物質或化學療法。
4. 本劑為腸溶膜衣錠，故請勿咬碎服用，以免造成失效。

「貯存」：

遮光、密封室溫貯存。

「包裝」：

6-1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182 之 1 號

