

高尿酸血症改善劑

優力康錠 50 公絲（本補麻隆）

Euricon Tablets 50mg（Benzbromarone）

衛署藥製字第 042754 號 G-6539

「作用」：

本品為一有效的促尿酸排泄劑，其主要作用可能係經由抑制近腎小管對尿酸鹽之再吸收，能降低血清中尿酸之濃度，增加尿中尿酸鹽之排泄。痛風患者在每天口服單一劑量後，約能使血清中尿酸濃度降低 50%-60%，故能有效減輕痛風性關節炎之症狀。本品口服後，2-3 小時即可達最高血中濃度，半衰期約 12-13 小時，主要經由腸道排出。

「成分」：每錠中含有

Benzbromarone 50MG

「適應症」：

痛風、高尿酸血症、高血壓所引起之高尿酸血症之改善。

「用法。用量」：

一天 1-3 次，一次 1 錠。

本藥須由醫師處方使用。

「警語」：

1. 猛爆性肝炎等嚴重肝臟不良反應主要會在開始投藥前六個月內發生，因此最少在最初給藥六個月內，應定期進行肝功能檢查。
2. 在使用期間如有肝臟不良反應之症狀如：食慾不振、全身倦怠發生時，應立即停止使用本藥品，並到醫療院所就醫檢查。

「禁忌」：

1. 伴生腎結石之患者，嚴重腎機能障礙之患者。
2. 孕婦及可能懷孕之婦女。
3. 肝功能異常者。

「一般的注意」：

1. 急性痛風發作時，不可開始使用本劑。
2. 本品具有顯著的血中尿酸降低作用，投與初期有

誘發痛風之可能。

3. 尿呈酸性之場合，患者可能會因尿酸結石產生血尿，易引起腎絞痛等之症狀，為防止這種情況發生，須增加水分之攝取，使尿量增加及尿液鹼化。但是在此情況下，須注意患者酸和鹽基之平衡。
4. 開始投與本藥品前應先進行肝功能檢查，以確認病人沒有肝功能異常。
5. 長期投與時，應定期施行肝機能之各種檢查。

「藥品相互作用」：

本品會加強 Coumarin 系抗凝血劑之作用，在併用之場合時，須測定 prothrombin 的時間，並慎重投與。

「副作用」：

1. 過敏症：偶有蕁麻疹、發疹、顏面發紅、紅斑、搔癢感。
2. 肝臟：GOT、GPT、Alkaliphosphatase 值之上升。
3. 消化器：偶有胃痛、腹痛、胃部不快感、胃灼熱、噁心、下痢、軟便等。
4. 其他：浮腫、心窩部不快感、頭痛。

「高齡者之投與」：

一般對於高齡之患者，因其生理機能已低下，應注意減低使用劑量。

「孕婦之投與」：

在動物實驗，曾有催畸形作用之報告，對於孕婦或有懷孕可能性之婦女，不可投與。

「包裝」：

2~1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

SYNMOSA

健喬信元醫藥生技股份有限公司

國回回 新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號