



CYT

衛署藥製字第044710號

抗組織胺劑

協帝[®] 膜衣錠10毫克

Cety[®] Film Coated Tablets 10mg

【成分】每錠中含：

Cetirizine hydrochloride..... 10mg

【特性】

Cetirizine為Anti-H₁之抗過敏治療劑，且無明顯Anti-Cholinergic及Anti-Serotonin作用。

在有效劑量內Cetirizine不會通過腦血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

【作用】

1. 迅速抑制外生性組織胺。
2. 對內生性組織胺的釋出有抑制作用(如48/80之組織胺)。
3. 抑制由VIP(Vasoactive Intestinal Polypeptide)和Substance P所引起之過敏反應。
4. 抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5. 明顯抑制發炎性細胞(例如eosinophils)的移動，而降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6. 顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7. 降低由特殊過敏原引起的過敏反應。

這些作用，由心智測驗及Quantified EEG得知，對中樞神經不會產生任何作用。

【藥物動力學】

口服Cetirizine 1小時內，會達血中最高濃度。

血漿半衰期成人約為10小時，6~12歲的孩童約為6小時，3~6歲的孩童約為5小時。

成人及孩童的蓄積腎排泄量(cumulative urinary excretion)約為投藥量的三分之二。

通常孩童的血漿清除率要比成人為高。

Cetirizine的吸收並無個體差異。

體內血漿濃度與投藥量成線性關係。

Cetirizine與血漿蛋白具有很強的結合能力。

【適應症】

季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

【用法・用量】

成人及3歲以上孩童適用。

成人及6歲以上孩童：每天10毫克(一錠)，於晚餐時與液體伴服。

3~6歲孩童：每天5毫克(半錠)，於晚餐時服用。或分別於早、晚各服用2.5毫克。

腎功能不全的患者服用本藥時，其劑量應減半。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

對本藥中任何成分有過敏者。

【副作用】

曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸道不適。

但由精神運動性(psychomotor)的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。

Cetirizine的過敏性徵狀極少被報導。

【孕婦、授乳婦之投與】

1. 動物實驗中，尚無引起不良反應之報告。但孕婦應避免使用本藥。

2. Cetirizine會被排泄至乳汁中，因此授乳婦不可使用本藥。

【藥物交互作用】

1. 至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。

2. 本藥應避免與過量的酒精併服。

【開車或操作機械】

實驗證明，對正常人投予每天20~25毫克的劑量，不會影響警覺及反應時間。

但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

【注意事項】

在治療劑量下，Cetirizine不會加重酒精(血中酒精濃度為0.8g/L時)的作用，但應避免。

【過量處理】

單次劑量超過50毫克時，會有安眠的症狀發生，無特殊之解毒劑。因此，如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

【保存上之注意】

- 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 室溫15-25℃乾燥處儲存。
- 請在有效期限內使用。

【包 裝】

2~1,000錠盒裝、塑膠瓶裝。

永 信 藥 品 工 業 股 份 有 限 公 司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL IND. CO., LTD TAIWAN R. O. C.
公司住址:台中縣大甲鎮中山路1段1191號
電 話: (04) 26875100
台中幼獅廠:台中縣大甲鎮日南里工九路27號