

“生達” 敵芬尼朵 糖衣錠

"Standard" Diphenidol S.C. Tablets

成 分：每錠含：

Diphenidol HCl.....25mg

作用及特長：1.改善椎骨腦底動脈之循環不全：本品於患側椎骨動脈之血管攣縮具有選擇性緩解作用，能除去患側與健側之血流量不平衡現象。
2.調整前庭神經路之機能：本品能在前庭神經核 level 遮斷由末梢前庭神經進入之異常刺激，更能在高位前庭性視床下部抑制刺激之傳達。
3.抑制異常眼振。

適應症：內耳障礙引起之眩暈（包括血管障礙及頭頸部外傷後遺症之眩暈）、（美尼攸氏）症候群

用法用量：通常成人1次1~2錠，1日3次經口投與，可依年齡症狀適宜增減之（飯後投與）。
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：(1)對藥物過敏之病人及腎機能有重篤障害者不宜使用。

(2)使用本劑時若有口渴、胸部灼熱感、散腫、動悸等症狀出現宜減藥量或停藥。
另在外國曾有發疹、不舒服感、頭痛、傾眠等症狀出現之報告。

副作用：在一般臨床試驗中曾有口渴、胸部灼熱感、散腫動悸等症狀之出現，惟經減藥量或停藥等處置後即消失。在全臨床試驗過程中所作一般臨床檢查、肝機能檢查、腎機能檢查、血液檢查並無觀察到涉及組織變性或器質異常之副作用。

貯 藏：貯存於乾燥避光之室溫處（25℃以下）。

包 裝：6-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第015078號 Code No. TD-07 2211280



PIC/S GMP藥廠
生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號