

“生達”服腦清（服納利林）錠 5 公絲

Fluzine (Flunarizine) Tablets 5mg “Standard”

衛署藥製字第 023918 號 Code.No.TF-01 2211360

“生達”服腦清錠，係本公司繼“賜腦清錠”後精心研究開發之血管擴張及循環改善劑。其主要成份 Flunarizine 之化學結構乃是 Cinnarizine 之二氟化衍生物，藥效比 Cinnarizine 強，且作用快速而持久，它可阻止內因性痙攣物質（如 Adrenaline，Noradrenaline，Dopamine，Angiotension，Vasopressin）所致之血管平滑肌之痙攣與血管收縮（Constriction of Vessels）以及 Histamine，Serotonine，Bradykinin 所引起之微血管緊張力不足（Capillary dystonia）。由於上述之藥理特性，因此能改善血液循環，增加氧氣之供應，故本品對於眩暈、暈動病、腦血管的循環，末梢血液循環障礙之改善與治療，效果極為優異。

「主成份」：每錠含：

Flunarizine 2HCl

equivalent to Flunarizine 5mg

「作用特點」：

- （1）劑量低，藥物比 Cinnarizine 強，且作用迅速而持久。
- （2）無毒性，無配伍禁忌，耐受性極佳，可長期安心服用。
- （3）服用後，不影響血壓、脈搏，故能維持體內循環之正常。
- （4）本品治療量，對於平滑肌細胞：如支氣管、腸等並無影響。
- （5）本品具有 antihistamine 及 Vascular – antispasmodic 之作用，可迅速改善過敏現

象及血管之痙攣。

（6）對於內耳障礙所引起之眩暈，Meniere’s Syndrome 藥效極佳。

「適應症」：

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

「用法用量」：

（1）通常每天晚上服用 2 錠，在前四周治療劑量可增加至 4 錠，（早晨 2 錠，晚上 2 錠）飯後服用。可依症狀增減之。

（2）預防暈車、船症，在旅遊前服用 2 錠。本藥須由醫師處方使用。

「注意事項」：

- （1）在治療的開始階段，對於個人的反應能力會受到限制，不適於長途開車或操作機械。
- （2）酒精類會加強本品之作用。
- （3）在接受治療之初期，偶而有胃腸道不適和疲乏的現象，當自動停藥數日或減量，通常這些現象會漸漸地減少。
- （4）如同一般新藥，動物試驗雖無催畸形作用之報告，但孕婦使用時仍需小心。



「禁忌症」：

急性腦出血之患者。

「包裝」：GMP 藥廠 ISO9001

6 錠樣品紙 生達化學製藥股份有限公司

1000 錠瓶裝 臺灣省台南縣新營市土庫里六號之二十