

"生達"心律 錠 10 公絲

PROPRANOLOL Tablets 10mg

衛署藥製字第 009102 號 Code No.TP-07 2211630

交感神經之感受體有二種， α -Receptor, β -Receptor，尤其心臟主要為 β -Receptor，當它受刺激時心收縮力增大，心拍數增加，支氣管擴張等作用。本劑主要作用即為對心臟 Catecholamine 之阻斷作用以保護心臟，使免受交感神經刺激的不良影響，對於狹心症(Angina Pectoris)不整脈(Arrhythmia)，褐色細胞腫瘤(Phaeochromocytoma)開刀前之處置與 α -Receptor Antagonist 如 Phenoxybenzamine 合併使用以控制併發之高血壓與梗塞性心肌肥大。

「成分」：每一錠中含有：

Propranolol HCl 10mg

「適應症」：

狹心症、不整律(上心室性不整律、心室性心搏過速)，原發性及腎性高血壓、偏頭痛、控制原發性震顫、控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症的補助劑、親絡細胞瘤。

「用法用量」：

1. 狹心症：每日四次，每次 20mg，逐漸增至每日三次，每次 40mg。
2. 不整律：每日 3~4 次，每次 10mg~30mg。
3. 梗塞性心肌肥大：每日三次或四次，每次 10mg~20mg。

本藥須由醫師處方使用。

「禁忌症」：

患有心臟衰竭(Heart Failure)心臟傳導隔斷(Heart block)或支氣管氣喘、乾草熱、慢性支氣管炎併發的支氣管痙攣者禁止使用本劑。又持續枵腹以及患糖尿病酮酸毒症(Diabetic keto-acidosis)或由於各種原因引起代謝性酸毒症(Metabolic acidosis)的患者亦忌用本劑。

「注意事項」：

1. 初患或久患心力衰竭而需要心臟交感興奮的病患，除非已施用毛地黃(Digitalis)或利尿劑以控制心力

衰竭，否則不宜服用本劑。對大多數病例而言，毛地黃能增加心肌收縮力，因此其施用本劑，不致使心力衰竭惡化。

2. 懷孕期內或使用 Ether 或 Chloroform 麻醉期間，施用本劑，應小心謹慎。如可能，應在施行外科手術前 24 小時前停用本劑。

3. 用於親絡細胞瘤之治療時，不可單獨使用，而必須與 α -Blockers 合用。

「不良反應」：

1. 間或有極少數病人對本劑很敏感，即使低劑量也有反應，甚至服食第一劑 20mg 後，會引起心臟跳動徐緩及血壓下降，自覺徵狀為虛弱或暈，此種病患應暫停使用本劑，重新服藥時應使用更低劑量，而且劑量遞增應更緩慢。

2. 大多數病人對本劑都有良好的耐受力，極少因暫時性的副作用而需要停止治療。約有 2% 病人曾發生輕微的副作用，如嘔心、失眠、怠倦、昏醉及輕微腹瀉，但如果採取遞增給藥法，上述副作用通常可避免。曾在個別報告中記錄有紫斑、紅斑性皮疹及手部感受異常。曾發現了某些本來血壓正常的患者，服用本劑後血壓逐漸下降，因此需要將劑量降低。

「服藥過量之處理法」：

如果心臟血管病變反應嚴重，應立即施行靜脈注射 Atropine Sulfate 1mg，如需要，繼之可服用一種 β -receptor 刺激劑如 Isoprenaline, Orciprenaline or Adrenaline。

「包裝」：

1000 錠以下瓶裝。



GMP 藥廠 ISO9001
生達化學製藥股份有限公司
臺灣省台南縣新營市土庫里六號之二十