

「晟德」

康是寧糖漿

Consrine Syrup 「CENTER」

GMP

G-7840

衛署藥製字第 045338 號

主 成 分：每公撮(ml)含有

Codeine Phosphate	0.48 mg
dl-Methylephedrine HCl	1.6 mg
Chlorpheniramine Maleate	0.25 mg
Glycyrrhizic Acid	0.25 mg

藥理作用：

Codeine phosphate 可直接抑制延腦的咳嗽中樞而抑制咳嗽反射作用，同時又能乾燥呼吸道之粘膜使支氣管的分泌物濃度增加。

Chlorpheniramine Maleate 是一種抗組織胺藥物，主要作用於 H₁ 細胞受體部位與組織胺產生競爭性的阻斷作用，同時也具有抗副交感神經作用(如口乾)和鎮靜作用。

dl-Methylephedrine HCl 為一個強擬交感神經興奮劑，直接刺激 α_1 和 β_1 及 β_2 腎上腺接受體部位，它能舒弛支氣管平滑肌，由於它作用於肺部的 β 腎上腺接受體所以是一種支氣管擴張劑。

Glycyrrhizic Acid 作為矯味和甜味劑用在咳嗽藥，它有溫和的抗炎及礦物皮質固性性質。

適 應 症：

鎮咳、祛痰。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

通常一日三次，每餐後服用；

成人每次 10ml；

12 歲以上適用成人劑量；

6 歲以上未滿 12 歲服用 5ml；

3 歲以上未滿 6 歲服用 2ml；

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

警 語：

1. 由於抽煙、氣喘、肺氣腫、慢性支氣管炎引發持續咳嗽的病患或者伴有大量分泌物之咳嗽病患，以及有青光眼或由前列腺腫大所引起之泌尿困難的病患不要使用此藥。
2. 小孩用藥應小心或者患有慢性肺病、呼吸短促、高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺疾病之病患服用此藥也要特別小心。
3. 不要超過規定用量，因為過量會引發神經質、頭昏目眩和失眠。
4. 如果服用 7 天不見症狀改善或伴有發燒，若繼續使用前請洽醫師。
5. 如果出現神經質、顫抖、失眠、食慾不振或作嘔等副作用時，劑量必須酌減或停止用藥。
6. 駕車或操作危險器械之病患要特別小心。
7. 服用本藥後，應被警告可能對酒精或其他中樞神經抑制劑(催眠劑、鎮靜劑等)有加成的症狀出現。
8. 長期使用易致成癮。

副 作 用：

常出現的副作用為：神經質、心神不寧、睡眠不佳、困倦、排尿困難、頭昏目眩、頭痛、噁心嘔吐、胃痛、便秘、發抖、呼吸困難、不尋常的臉色發白、肌肉無力、心律不整、意志消沉、低血壓、耳鳴、興奮、不協調、中樞神經抑制作用、心悸、口渴、腹瀉、尿滯留、支氣管分泌物增濃、心跳過速等。

注意事項：

1. Codeine phosphate 因有抑制呼吸及提高腦脊髓液壓力作用，將引起頭痛、顱內傷害或增加顱內壓力。
2. 服用 Codeine phosphate 會掩蓋病患的腹部疾病症狀。
3. 以下病患服用 Codeine phosphate 產品要多加小心：老年人、過度疲勞者、患有嚴重肝腎功能損害的疾病者、艾迪生病患、前列腺肥大者以及尿道狹窄者等。
4. Codeine phosphate 對肝腎功能不良病患有延長累積作用。
5. Codeine phosphate 會降低人的心理和生理能力、駕車及操作機器之病患要特別小心。
6. Codeine phosphate 與其他麻醉止痛藥、一般麻醉劑、phenothiazines、鎮靜劑、鎮靜催眠藥，及其他中樞神經抑制劑(如酒精)併用會增加其鎮靜作用，如果一定要併用需酌減服用量。
7. 至今尚無進行 Codeine phosphate 對生育及胎兒方面的影響實驗，故對胎兒的影響仍未知，但懷孕婦女一定要服用時要多加小心。
8. Codeine phosphate 會從乳汁中排出，授乳婦女要謹慎服用。
9. 連續服用 dl-Methylephedrine HCl 產品會引起失眠。
10. dl-Methylephedrine HCl 與心臟配糖體，吸入性麻醉劑鹵乙烷(halothane)併用將引起心律不整，與高血壓用藥 guanethridine 合用，將增加擬交感神經興奮劑的作用，與麥角生物鹼衍生物或催產素合用，會增加高血壓危險。
11. 因缺乏 dl-Methylephedrine HCl 在動物或人體方面對孕婦是否導致流產或胎兒是否畸形作用之報導，因此不推薦孕婦使用。
12. 因缺乏可靠報導 dl-Methylephedrine HCl 產品用於授乳婦之可靠報導，除非醫生許可，授乳婦最好也不要使用。
13. 青光眼、孕婦、及對此藥物有過敏之病患使用時要特別注意，大量服用此藥會使癲癇症患者加速發作。
14. 與中樞神經抑制劑合用會增加其鎮靜作用。與抗副交感神經作用劑、三環抗抑鬱劑及 MAOI 等合用會有類阿托品的作用。
15. 除非醫師、藥師、藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

包 裝：10~4000 公撮塑膠瓶裝

貯 存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)使用後請密封避光貯存於 25°C。

製 造 廠：

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠

CENTER LABORATORIES INC.

廠址：新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路 2 號

公司電話：(02) 2547-4332 圖文傳真：(02)2545-3562

工廠電話：(03) 598-1829 圖文傳真：(03) 598-1820