



“杏輝”

G.M.P. 藥品

欣胃立康[®]錠

ULWYCON[®] Tablets “Sinphar”

—— 胃腸道疾病緩解劑 ——
(Anti-Acid Agent)

成份：每Tablet含：

Aluminium hydroxide dried gel.....200mg

Magnesium hydroxide.....200mg

Simethicone.....20mg

單次劑量(2錠)之酸中和能力為19.3mEq，鎂含量為13.7mEq。

作用：

(1)制酸及消除胃腸內之氣體。

(2)沒有便秘現象。

適應症：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

用法用量：

一天3次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

一、為防止兒童誤食請妥善保管。

二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。

四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

警語：

一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(一)對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。

(二)未滿3個月之嬰兒不得服用。

(三)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。

(四)制酸劑不得併用其它藥品。

二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。

三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。

四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

包裝：

12~1000、2000錠塑膠瓶裝。

儲存溫度：室溫(15~30℃)

衛署藥製字第034012號

G.M.P.



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號

84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)021053 - 015151

web site：http://www.sinphar.com