

抑制氫離子幫浦的消化性潰瘍治療劑

"南光"歐克胃膠囊 20 公絲

Okwe Capsules 20mg "N.K."

衛署藥製字第 044270 號 G.M.P. : G-7438

Omeprazole 是經由高選擇性的作用機轉而達到降低胃酸分泌的作用。Omeprazole 可以其特定的劑量依賴性，而抑制在胃壁細胞內的 H^+, K^+ -ATPase 的酵素作用(氫離子幫浦)，由於此種機轉作用，Omeprazole 可抑制胃酸形成的最後階段，因此可有效地抑制基礎胃酸及因刺激而產生的胃酸分泌。

Omeprazole 對於膽素脂鹼及組織胺受體不產生任何作用，而且在藥品動力學上對於酸分泌的影響作用報告，臨床上並沒有顯示任何不利的意義，本產品作用迅速，而且一日一次劑量對於胃酸的分泌可達到可逆性的控制。

「成分」: Each Capsule contains:

Omeprazole 20mg

「適應症」:

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群。

「用法用量」:

本藥須由醫師處方使用。

十二指腸潰瘍、胃潰瘍和逆流性食道炎-

推薦劑量是一天一次 20mg 的 Omeprazole。

對患有十二指腸潰瘍的病人其症狀的減輕非常快速，一般的情況下兩個星期內就能復原。在初步治療中還不能完全痊癒的病患，通常再經過兩個星期的治療就可復原。對患有胃潰瘍和逆流性食道炎的病人，其症狀的減輕非常迅速，大多數的患者四個星期內就能痊癒，在初步的治療中還不能完全痊癒的病患，通常再經過四個星期就可完全復原。不易治癒的病人，可使用一天 40mg Omeprazole 治療。通常對患有十二指腸潰瘍的病人，四個星期內可以痊癒；對胃潰瘍和逆流性食道炎的病人，則在八個星期內可以復原。

Zollinger-Ellison 症候群-

初期的建議劑量是每天一次 60mg 的 Omeprazole，劑量需按個別的需要調整，只要臨床上有治療的需要就須繼續治療，所有情況嚴重及對其他治療有不良反應的病人都能得到有效的控制。超過 90% 的病人，每天以 20~120mg 的劑量治療，當每日的劑量超過 80mg 需將劑量分成兩次投予。於潰瘍發作時，可與 Amoxicillin 併用，預防癒後復發，以 Omeprazole 40mg/天 + Amoxicillin 2g/天，治療兩週。

「注意事項」:

1. 當懷疑是胃潰瘍，而有惡化的可能時，應立即就醫，因為

如果給予治療會減輕其症狀，而延誤就診。

2. 除 Zollinger-Ellison 症候群外，服用期不宜超過八星期。

3. 孕婦及授乳期之使用: 誠如其他新的藥品，除非在必要的情況下，不應使用在懷孕及授乳期的婦女。在動物實驗中尚無任何副作用報告指出說 Omeprazole 使用在懷孕及授乳的動物上有胎兒毒性或致畸胎作用發生。

4. 目前使用 Omeprazole 尚無任何配伍禁忌。

5. 腎或肝功能不全時，無需調整本品之劑量。

6. 老年人之劑量無需調整，至於在孩童則尚無使用之經驗。

「副作用」:

Omeprazole 的耐受性良好，一些臨床報告有噁心、頭痛、腹瀉、便秘及脹氣等症狀，但相當少。皮膚紅也發生在少數病患身上。這些現象都只是短暫而輕微的，而且和治療並沒有一定的關係。

「藥品交互作用」:

Omeprazole 會延長 Diazepam 和 Phenytoin 的排除作用，因為這些藥物是在肝中氧化代謝，如果病人同時服用 Phenytoin，則應予以減量，並加以追蹤觀察。和 Theophyllin 併服並無交互作用發生，但如併用其他經由 Cytochrome P450 酵素系統代謝的藥物，可能會產生交互作用，如 Warfarin。和制酸劑併用則無交互作用發生。

「使用過量」:

尚無人體使用過量的報告，亦無法提供特別的療法。

單一口服劑量加至 160mg 時，耐受性相當良好。

「儲藏」:

本品應於 30°C 以下避光貯存，且由於本品怕潮，請務必將瓶蓋緊封。

此外，請置於兒童無法取得之處，並於包裝上之保存期限內使用。

「包裝」:

2~1000 粒塑膠瓶裝或鋁箔盒裝。

本品的鋁箔標識為:  Okwe 20



南光化學製藥股份有限公司
台灣·台南縣新化鎮中山路1001號
TEL: 06-5984121(代表) FAX:
06-5972033

抑制氫離子幫浦的消化性潰瘍治療劑

“南光” 歐克胃 膠囊 20公絲

Okwe Capsules 20 mg "N.K."

Omeprazole是經由高選擇性的作用機轉而達到降低胃酸分泌的作用。Omeprazole可以其特定的劑量依賴性，而抑制在胃壁細胞內的 $H^+, K^+-ATPase$ 的酵素作用(氫離子幫浦)，由於此種機轉作用，Omeprazole可抑制胃酸形成的最後階段，因此可有效地抑制基礎胃酸及因刺激而產生的胃酸分泌。Omeprazole對於膽素脂鹼及組織胺受體不產生任何作用，而且在藥品動力學上對於酸分泌的影響作用報告，臨床上並沒有顯示任何不利的意義，本產品作用迅速，而且一日一次劑量對於胃酸的分泌可達到可逆性的控制。

□成分：Each capsule contains:

Omeprazole20 mg

□適應症：

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群。

□用法用量：本藥須由醫師處方使用。

十二指腸潰瘍、胃潰瘍和逆流性食道炎—

推薦劑量是一天一次20mg的Omeprazole。

對患有十二指腸潰瘍的病人其症狀的減輕非常快速，一般的情況下兩個星期內就能復原。在初步治療中還不能完全痊癒的病患，通常再經過兩個星期的治療就可復原。對患有胃潰瘍和逆流性食道炎的病人，其症狀的減輕非常迅速，大多數的患者四個星期內就能痊癒，在初步的治療中還不能完全痊癒的病患，通常再經過四個星期就可完全復原。不易治癒的病人，可使用一天40mg Omeprazole治療。通常對患有十二指腸潰瘍的病人，四個星期內可以痊癒；對胃潰瘍和逆流性食道炎的病人，則在八個星期內可以復原。

Zollinger-Ellison症候群—

初期的建議劑量是每天一次60mg的Omeprazole，劑量需按個別的需要調整，只要臨床上有治療的需要就須繼續治療，所有情況嚴重及對其他治療有不良反應的病人都能得到有效的控制。超過90%的病人，每天以20~120mg的劑量治療，當每日的劑量超過80mg需將劑量分成兩次投予。於潰瘍發作時，可與Amoxicillin併用，預防癒後復發，以Omeprazole 40mg/天+Amoxicillin 2g/天，治療兩週。

□注意事項：

1. 當懷疑是胃潰瘍，而有惡化的可能時，應立即就醫，因為如果給予治療會減輕其症狀，而延誤就診。

2. 除 Zollinger-Ellison 症候群外，服用期不宜超過八星期。
3. 孕婦及授乳期之使用：誠如其他新的藥品，除非在必要的情況下，不應使用在懷孕及授乳期的婦女。在動物實驗中尚無任何副作用報告指出說 Omeprazole 使用在懷孕及授乳的動物上有胎兒毒性或致畸胎作用發生。
4. 目前使用 Omeprazole 尚無任何配伍禁忌。
5. 腎或肝功能不全時，無需調整本品之劑量。
6. 老年人之劑量無需調整，至於在孩童則尚無使用之經驗。

□副作用：

Omeprazole 的耐受性良好，一些臨床報告有噁心、頭痛、腹瀉、便秘及脹氣等症狀，但相當少。皮膚紅也發生在少數病患身上。這些現象都只是短暫而輕微的，而且和治療並沒有一定的關係。

□藥品交互作用：

Omeprazole 會延長 Diazepine 和 Phenytoin 的排除作用，因為這些藥物是在肝中氧化代謝，如果病人同時服用 Phenytoin，則應予以減量，並加以追蹤觀察。和 Theophyllin 併服並無交互作用發生，但如併用其他經由 Cytochrome P450 酵素系統代謝的藥物，可能會產生交互作用，如 Warfarin。和制酸劑併用則無交互作用發生。

□使用過量：

尚無人體使用過量的報告，亦無法提供特別的療法。

單一口服劑量加至 160 mg 時，耐受性相當良好。

□儲藏：本品應於 30℃ 以下避光貯存，且由於本品怕潮，請務必將瓶蓋緊封。此外，請置於兒童無法取得之處，並於包裝上之保存期限內使用。

□包裝：2~1000 粒塑膠瓶裝或鋁箔盒裝。

本品的鋁箔標識為：ⓃⓀ Okwe 20

衛署藥製字第 044270 號

G.M.P.:G -7438



南光化學製藥股份有限公司

台灣 台南縣新化鎮中山路 1001 號

TEL: (06) 5984121 (代表) FAX: (06) 5981845