



“杏輝”

G.M.P. 藥品

欣胃立康 懸濁液
ULWYCON Suspension “Sinphar”
 ——胃腸道疾病治療劑——
 (Anti-Acid Agent)

本劑為乳白色，味清涼之懸濁液，配有Simethicone及二種制酸劑，對胃酸之中
和及胃腸氣脹之消除為有效。

成 份：每mL含：

Simethicone.....	4mg
Aluminium hydroxide dried gel.....	40mg
Magnesium hydroxide.....	40mg

作用：

- (1)制酸及消除胃腸內之瓦斯。
- (2)易於服用，安全沒有便秘現象。

適 應 症：緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良、解除脹氣、緩解氣脹
相關症狀。

用法用量：每次服用5~10mL，飯後一小時及睡前或需要時服用。
用前請搖勻。

副 作 用：

- 1.含鎂之制酸劑可能會引起腹瀉。
- 2.含鋁之制酸劑可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

注意事項：

- 1.須置於小孩接觸不到之處。
- 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
- 5.液劑使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 6.服用本品偶有軟便情形。
- 7.本品和Digoxin、Phenytoin、Isoniazid、Phenothiazine、Quinidine
、Warfarin、四環類抗生素藥品有交互作用，請依醫師指示使用。
- 8.腎衰竭病人應請教醫師後小心給藥。

警 語：

- 1.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，一天內不可服用超過每日最大劑量
之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。
- 2.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，未滿3個月之嬰兒不得服用。
- 3.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，每日最大建議劑量含鎂量超過
50mEq(600mg)或含鉀量超過25mEq(975mg)鉀之制酸劑，腎疾患
者不要服用。
- 4.如有慢性胃痛，胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用制
酸劑。
- 5.消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 6.除非有藥師、藥劑生或醫師指示，制酸劑不得併用其它藥品。

醫師、藥師、藥劑生指示藥品

衛署藥製字第034013號

包 裝：4000公撮以下鋁箔、盒裝、瓶裝



G.M.P.

® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村84號

84, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

服務專線：(0800)021053、015151

web site：http://www.sinphar.com

10-070-02