

雌激素缺乏治療劑

**益斯得錠** 2 毫克

(氫偶素)

**Estrade** Tablets 2MG (Estradiol)



928001

### 【說明】

**Estradiol Valerate** 此乃卵巢分泌的天然雌激素酯  $17\beta$ -estradiol，在生理用藥上，長期使用不會有合成雌性激素所引起血栓塞的危險。以口服用藥後，在肝臟首度效應，會刺激蛋白質的生合成，如血管收縮素(Angiotension)。

在停經婦女或卵巢摘除者，可補充雌性激素，改善雌性激素缺乏症及更年期症狀，尤其是預防骨質大量流失所致骨質疏鬆症及骨折。

### 【作用】

**Estradiol Valerate** 可使女性出現第二特徵，維持女性性器機能，如加厚和增加血管的發育及子宮內膜的腺體，使用於不孕症婦女荷爾蒙補充，可促進陰道黏膜組織生長，治療陰道萎縮，陰道乾燥搔癢，陰道炎及卵巢切除或機能障礙所致雌激素不足。在生理代謝作用，能促進骨質沈積，降低骨質流失，治療停經後的骨質疏鬆症。此外，**Estradiol Valerate** 在肝臟可促進脂蛋白和膽固醇代謝，預防粥狀動脈硬化，冠狀動脈疾病發生。

### 【成分】每錠中含有

**Estradiol Valerate** ..... 2mg.

### 【適應症】

更年期症狀及停經後引起的各種病症、卵巢切除之患者(因疾病或腫瘤而將卵巢切除)。

### 【用法·用量】

開始治療時，通常成人一天 2mg，20~21 天後至少停藥一星期，然後將劑量減至一天 1mg。

本藥須由醫師處方使用。

### 【禁忌】

乳房及子宮之惡性腫瘤，懷孕。

### 【警告】

心血管疾病如瓣膜疾病，凝血異常，嚴重肝功能障礙須謹慎投與。

心期間出血時應查出隱藏的病因。

### 【注意】

若有動脈血管堵塞之虞，會隨著吸煙而加重。

突發的症狀伴有急性併發症必須停止治療：嚴重性頭痛，視覺障礙，血壓增高。

### 【藥品相互作用】

不建議併用下列藥物：

酵素誘導劑：抗癲癇(Carbamazepine、Phenobarbital、Phenytoin、Primidone)，Rifampicin，Griseofulvin，併用上列藥物會減少 **Estradiol Valerate** 治療效果。

### 【副作用】

噁心、頭痛、體重增加、乳房脹痛。

### 【包裝】

2~1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 G-5264 號  
039822 號

**SYNMOSA**

健喬信元醫藥生技股份有限公司

健喬廠 3030 新竹縣湖口鄉工業一路6號

SLT9280H