

綜合性貧血治療劑

"正和" 益血康 糖衣錠

Bloodfull S.C. Tablets "C.H."

衛署藥製字第 24053 號

本劑服用後，能增加血液內之血色素，因血色素或赤血球缺乏常致罹患貧血症(即一般貧血)，或由於缺乏補血素所致之高血色素巨細胞性貧血(即惡性貧血等)，前者主要由於缺乏鐵質所致，應用鐵劑之療效甚佳，後者治療時應用肝胃製劑及葉酸方屬有效，貧血之原因有失血過多，營養不良，或由於血球死亡數增加，本劑為綜合性補血劑，對於上述之一般貧血，惡性貧血，失血過多，營養不良等，服用本劑療效甚佳。

「組成」：Each S.C. Tab Contains：

Ferrous Fumarate	50mg
Folic acid	2mg
Cyanocobalamin	2mcg
Thiamine mononitrate	1mg

Riboflavin	1mg
Nicotinamide	3mg

「適應症」：

妊娠期、發育期、貧血、手術後及其他一般鐵質缺乏性貧血，低血色素性貧血。

「用法用量」：

通常成人一次二錠，一日三次於每飯中或每飯後即時服用，有必要時可加倍服用，兒童減半服用，本劑須由醫師處方使用。

「包裝」：

100s，500s，1000s 瓶裝。

正和製藥股份有限公司

台南縣新營市新工路 23 號(新營工業區)

正和商標



正確藥效

綜合性貧血治療劑

“正和” **益血康** 糖衣錠

Bloodfull S.C. Tablets “C.H.”

本劑服用後，能增加血液內之血色素，因血色素或赤血球缺乏常致罹患貧血症（即一般貧血），或由於缺乏補血素所致之高血色素巨細胞性貧血（即惡性貧血等），前者主要由於缺乏鐵質所致，應用鐵劑之療效甚佳，後者治療時應用肝胃製劑及葉酸方屬有效，貧血之原因有失血過多，營養不良，或由於血球死亡數增加，本劑為綜合性補血劑，對於上述之一般貧血，惡性貧血，失血過多，營養不良等，服用本劑療效甚佳。

☒組 成：Each S.C. Tab Contains:

Ferrous Fumarate	50mg
Folic acid	2mg
Cyanocobalamin	2mcg
Thiamine mononitrate	1mg
Riboflavin	1mg
Nicotinamide	3mg

☒適應症：

妊娠、發育期、貧血、手術後及其他一般鐵質缺乏性貧血，低血色素性貧血。

☒用法用量：

通常成人一次二錠，一日三次於每飯中或每飯後即時服用，有必要時可加倍服用，兒童減半服用，本劑須由醫師處方使用。

☒包裝：100s, 500s, 1000s瓶裝。

衛署藥製字第24053號

正和製藥股份有限公司新營廠

台南縣新營市新工路23號（新營工業區）