

杏化潤[®]柔滋霜

SINPHARDERM-HC[®] Cream “Sinphar”

—— 皮膚抗炎乾裂治療劑 ——

(Anti-inflammatory Xerosis Preparation)

杏化潤柔滋霜含有Urea及 Hydrocortisone acetate 之複合配方，可達協同作用，增加本劑對於各種皮膚疾患之治療效果。Urea—可增加皮膚之保濕作用，並具有溶解皮膚角質的功能，軟化粗糙乾裂、魚鱗化之皮膚，使皮膚回復正常功能。Hydrocortisone acetate—能有效迅速控制各種皮膚炎症狀、濕疹及搔癢，並可降低Urea於皮膚所造成的刺激及敏感性。

成 分：每gm含：

Hydrocortisone acetate.....10mg
Urea.....100mg

適 應 症：濕疹或皮膚炎、去角質。

用法用量：塗抹適量之本劑於患部，每天1-2次。

副 作 用：

局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。

全身性：庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足 (secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、惡心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

警 語：

1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3. 癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4. 臉部、腋下及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
5. 皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

醫師藥師藥劑生指示藥品

衛署藥製字第019614號

包 裝：1000公克以下塑膠瓶、塑膠軟管裝



杏輝藥品工業股份有限公司
SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website: <http://www.sinphar.com>