

益痔康 軟膏

alcos-anal® ointment

39A08

益痔康 (alcos-anal®) 刺激衰退結締組織的新生，使痔核壁產生新的結締組織。這些新組織日漸收縮，使痔核日漸縮小，最後僅殘留一小形隆起之厚皮，痔瘡即形治癒。至於肛門之搔癢及濕疹。在應用益痔康短時間內即可消失。

【適應症】痔瘡

【用法】

外痔：以溫水洗淨肛門，以軟紙拭乾，再塗佈益痔康軟膏。於夜晚使用時，在塗佈藥膏後，如能覆以軟布，則效力更佳。

內痔：

油膏：軟膏管上套以使用器，為使插入肛門便利，宜先塗些軟膏於使用器上，再行儘量插入肛門，輕壓軟膏管，同時緩慢拉出使用器，軟膏遂均勻塗布於內痔患處。將使用器清潔後備下次使用。

本藥須由醫師處方使用

【注意】

1. 本品中之 Pistocain 具有表面擴散作用及局部麻醉作用。一方面使益痔康之有效成份 Sodium Oleate 迅速擴佈於粘膜表面及皺摺處發生治療作用，同時在痔核表面發生麻醉作用。通常在短時內疼痛即可消失，流血亦可停止，此即所謂症狀治療。
2. 即使症狀消失後，仍須繼續用藥數星期，以求根治。而防復發。
根治之方法，最好於早晨、夜晚及便後各用藥一次。因為內痔與外痔常連帶發生，塞劑與軟膏如能同時使用，效力更佳，通常根治之時間約需 6~8 星期左右。
3. 初用藥時常有灼熱感覺，止即開始發生療效的現象。此種現象在用藥兩三日後即消失。
4. 便秘及堅硬之大便對痔瘡之治療常有很大的防害，患者應養成每日大便的習慣，並保持大便的暢通。
5. 注意保持肛門之清潔，並使用軟質衛生紙。

【成份】

每公克含：

| | |
|---|-------|
| Sodium oleate | 100mg |
| Hydroxypolyethoxydodecane (Polidocanol, Pistocain®) | 20mg |
| Chlorocypacrol (Carvasept®) | 1 mg |

【包裝】

1000克以下軟管裝

委託製造者：育新企業有限公司
 台北市石牌路二段99巷9號6F
 製造廠：明德製藥股份有限公司
 桃園縣楊梅鎮民富路二段360號