

(無香料含薄荷)

衛署藥製字第041057號  
GMP·G-5751

## "壽元" 可貝乳膏 0.5毫克/公克(可洛貝他松)

Cloba Cream 0.5mg/gm "S.Y."(Clobetasone)

【成分】：Each gm contain:

Clobetasone butyrate.....0.5mg  
賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate,  
Cream Base Wax, Polyoxyethylene(25)Cetyl Ether,  
Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben,  
Peppermint Oil, Purified Water.

【作用】：

本劑有局部抗炎作用，以Mc kenzie法作皮膚血管收縮試驗，  
其局部抗炎活性為Fluocinolone Acetonide的2.6倍。

【注意事項】：

1.一般注意：

- (1)伴有皮膚感染的濕疹、皮膚炎，以不要使用為原則，如要  
使用時，請併用其他抗菌劑或抗黴菌劑治療。
- (2)如大量長期廣範圍封閉使用，可能會有steroid的全身投  
予一樣的症狀出現。

2.禁忌：

- (1)對本劑成分有過敏的既往病例之患者。
- (2)有鼓膜穿孔的濕疹性外耳道炎之患者。
- 3.皮膚有細菌、真菌感染時，使用時必須慎重。

4.副作用：

- (1)皮膚感染症：偶而會有細菌或真菌感染症出現，必要時適  
當使用抗菌劑或抗真菌劑，如症狀不能改善，則請中止使  
用。
- (2)其他皮膚症狀：長期使用可能會引起steroid皮膚、多毛  
或色素脫失等現象。
- (3)過敏症：偶有紅斑出現，必要時請中止使用。
- (4)大量長期廣範圍使用密封法可能會對腦下垂體、副腎皮質  
機能性之抑制，請注意。
- (5)孕婦使用：安全性未確立，請避免大量長期使用。
- (6)乳兒小兒的使用：長期大量使用封閉法會使小兒發育障害  
。
- (7)本劑不可使用於眼睛。
- (8)使用後如症狀無改善，請中止使用。
- (9)顏面、陰部的病巢請勿長期使用。

【用法用量】：

1日1~數回塗布，本藥須由醫師處方使用。

【適應症】：

輕度濕疹、脂漏性皮炎、其他對類固醇有反應的皮膚疾患。

【儲存】：

請儲存於30°C以下。

【包裝】：

1000gm以下，鋁管及塑膠瓶裝。

壽元化學工業股份有限公司  
嘉義市新民路128號

(有香料)

衛署藥製字第041057號  
GMP·G-5751

## "壽元" 可貝乳膏 0.5毫克/公克(可洛貝他松)

Cloba Cream 0.5mg/gm "S.Y."(Clobetasone)

【成分】：Each gm contain:

Clobetasone butyrate.....0.5mg

賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate,  
Cream Base Wax, Polyoxyethylene(25)Cetyl Ether,  
Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben, Fragrance  
754, Peppermint Oil, Purified Water.

【作用】：

本劑有局部抗炎作用，以Mc kenzie法作皮膚血管收縮試驗，  
其局部抗炎活性為Fluocinolone Acetonide的2.6倍。

【注意事項】：

1.一般注意：

- (1)伴有皮膚感染的濕疹、皮膚炎，以不要使用為原則，如要使用時，請併用其他抗菌劑或抗黴菌劑治療。
- (2)如大量長期廣範圍封閉使用，可能會有steroid的全身投予一樣的症狀出現。

2.禁忌：

- (1)對本劑成分有過敏的既往病例之患者。
- (2)有鼓膜穿孔的濕疹性外耳道炎之患者。
- 3.皮膚有細菌、真菌感染時，使用時必須慎重。
- 4.副作用：

- (1)皮膚感染症：偶而會有細菌或真菌感染症出現，必要時適當使用抗菌劑或抗真菌劑，如症狀不能改善，則請中止使用。
- (2)其他皮膚症狀：長期使用可能會引起steroid皮膚、多毛或色素脫失等現象。
- (3)過敏症：偶有紅斑出現，必要時請中止使用。
- (4)大量長期廣範圍使用密封法可能會對腦下垂體、副腎皮質機能性之抑制，請注意。
- (5)孕婦使用：安全性未確立，請避免大量長期使用。
- (6)乳兒小兒的使用：長期大量使用封閉法會使小兒發育障害。
- (7)本劑不可使用於眼睛。
- (8)使用後如症狀無改善，請中止使用。
- (9)顏面、陰部的病巢請勿長期使用。

【用法用量】：

1日1~數回塗布，本藥須由醫師處方使用。

【適應症】：

輕度濕疹、脂漏性皮炎、其他對類固醇有反應的皮膚疾患。

【儲存】：

請儲存於30°C以下。

【包裝】：

1000gm以下，鋁管及塑膠瓶裝。

壽元化學工業股份有限公司  
嘉義市新民路128號

## "壽元" 可貝乳膏 0.5毫克/公克(可洛貝他松)

Cloba Cream 0.5mg/gm "S.Y."(Clobetasone)

【成分】：Each gm contain:

Clobetasone butyrate.....0.5mg

賦形劑：Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Isopropyl Myristate,  
Cream Base Wax, Polyoxyethylene (25) Cetyl Ether,  
Glyceryl Monostearate, Methyl Paraben, Purified  
Water.

【作用】：

本劑有局部抗炎作用，以Mc kenzie法作皮膚血管收縮試驗，  
其局部抗炎活性為Fluocinolone Acetonide的2.6倍。

【注意事項】：

1.一般注意：

- (1)伴有皮膚感染的濕疹、皮膚炎，以不要使用為原則，如要  
使用時，請併用其他抗菌劑或抗黴菌劑治療。
- (2)如大量長期廣範圍封閉使用，可能會有steroid的全身投  
予一樣的症狀出現。

2.禁忌：

- (1)對本劑成分有過敏的既往病例之患者。
  - (2)有鼓膜穿孔的濕疹性外耳道炎之患者。
- 3.皮膚有細菌、真菌感染時，使用時必須慎重。

4.副作用：

- (1)皮膚感染症：偶而會有細菌或真菌感染症出現，必要時適  
當使用抗菌劑或抗真菌劑，如症狀不能改善，則請中止使  
用。
- (2)其他皮膚症狀：長期使用可能會引起steroid皮膚、多毛  
或色素脫失等現象。
- (3)過敏症：偶有紅斑出現，必要時請中止使用。
- (4)大量長期廣範圍使用密封法可能會對腦下垂體、副腎皮質  
機能性之抑制，請注意。
- (5)孕婦使用：安全性未確立，請避免大量長期使用。
- (6)乳兒小兒的使用：長期大量使用封閉法會使小兒發育障害  
。
- (7)本劑不可使用於眼睛。
- (8)使用後如症狀無改善，請中止使用。
- (9)顏面、陰部的病巢請勿長期使用。

【用法用量】：

1日1~數回塗布，本藥須由醫師處方使用。

【適應症】：

輕度濕疹、脂漏性皮炎、其他對類固醇有反應的皮膚疾患。

【儲存】：

請儲存於30°C以下。

【包裝】：

1000gm以下，鋁管及塑膠瓶裝。

壽元化學工業股份有限公司  
嘉義市新民路128號