

敏撲寧 乳膏 0.5毫克/公克

Ciprosone Cream 0.5mg/gm

【敘述】

敏撲寧乳膏主成份為二丙酸貝它皮質醇，為一種合成的氟化類固醇。
敏撲寧乳膏每公克含0.05% 即0.64公絲Betamethasone Dipropionate (相當於0.5公絲Betamethasone)。

【作用】

敏撲寧乳膏具抗發炎、止癢、血管收縮等作用，具持續性，一天只需早晚各使用一次。

【適應症】

接觸性皮膚炎，異位性皮膚炎(過敏性皮膚炎)，神經性皮膚炎，溼疹。

【用法用量】

每日早晚各一次，均勻塗抹患部。
對某些患者減少使用次數，亦足以維持治療劑量。

【副作用】

局部使用類固醇，尤其是在密封包紮時，據報告稱會發生以下局部不良反應：灼熱、搔癢、刺激、乾燥、毛囊炎、多毛症、痤瘡、色素減少，口周圍皮膚炎、過敏性接觸性皮膚炎、次級感染、皮膚萎縮、皮膚起紋或痂。

【禁忌症】

敏撲寧乳膏禁用於曾對成分敏感之病患。

【注意事項】

使用敏撲寧引起刺激或過敏時應停止治療。
如有感染，可用適當的抗菌劑(Antibacterial或Antifungal Agent)。
如感染未能立刻控制住，則應停用類固醇，直至感染情形控制，方可再用。
局部使用類固醇，有時也會發生全身性類固醇的副作用，例如抑制腎上腺(Adrenal Suppression)。嬰兒和兒童尤易發生。
類固醇製劑在長期使用或廣體治療時，會經由皮膚吸收，尤其是密封包紮時，可能會造成全身性的作用，須特別注意。
嬰兒和兒童更需特別小心。
敏撲寧乳膏不適用於眼睛。

【孕婦使用】

敏撲寧乳膏對孕婦的安全性尚未建立。孕婦不宜大量或長期使用。

【適量】

症狀：過量使用，會抑制腦垂體－腎上腺功能。
治療：急性類固醇不足，可以復原，如有需要可給予電解質助其平衡。
如為慢性中毒，可以緩和漸進方式停藥。

【藥物注意事項】本藥品需保存在25℃以下。

【包裝】1000公克以下鋁軟管、裝塑膠瓶裝。

本藥須經醫師處方使用。

衛署藥製字第 G-7700 號。
044969 號。

【製造廠】



中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠址：251新北市淡水區埤島里埤島42-10號
服務專線：(0 2) 8 6 3 1 - 0 0 1 8