

390092



"愛爾康比利時廠"
淚膜眼藥膏
 Duratears® Sterile Ophthalmic Ointment
 衛署藥輸字第017121號

愛爾康™
 愛你眼睛健康

乾眼

淚腺產生之天然淚液，其質或量改變，會造成乾眼。因為淚液的不完整，所以淚液在眼睛的表面會較快被崩解形成乾點，而不會形成平滑且連續的潤滑層。這些乾點是非常敏感而且是不舒服的。有許多的原因會造成乾眼，但最常見的是老化。隨著年齡的增長，淚液的生成會自然地減少，由於淚液的缺乏，因此眼睛變“乾”的傾向會增加。除了年齡之外，其它的致病因素尚包括過敏、維生素缺乏以及乾熱的氣候環境。

乾眼的症狀是什麼？

因為許多的原因會造成乾眼，因此症狀可能會有所變化。然而，最常見的症狀包括眼睛灼熱、癢、異物感、疲勞及紅腫。某些病例，不舒服可能引起淚液過多，但是因為它們缺乏某些成份，所以這些過多的淚液無法適當地濕潤眼睛，而變成是一種困擾。

舒解乾眼

對於乾眼問題的解決方法，最令人滿意的答案是使用人工淚液，以及使用特殊的潤滑軟膏(假如需要的話)。軟膏通常於夜晚使用，以提供睡眠期間的潤滑。愛爾康實驗室-世界最大的眼藥製造廠-即生產如此之產品：Duratears® 眼用潤滑軟膏。

簡介：

Duratears 軟膏含：White Petrolatum, Anhydrous Liquid Lanolin 及 Mineral Oil。由於Duratears 軟膏專為使用於眼睛而經特殊設計，所以在晚上的期間，當使用人工淚液是無法達預期效果時，Duratears對於保持眼睛的潤滑及舒適是很理想的。Duratears軟膏不含藥物成份，其為一種平滑舒適的軟膏基劑，能夠快速溶解以及防止乾燥和不舒服。本品為非處方用藥。

適應症：暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

禁忌：若對本品任一成份過敏則勿使用。

注意事項：1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3. 使用前，請洗淨雙手。

4. 請依照藥品標示使用。

5. 藥品變色或出現異物時請丟棄。

6. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。

7. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

8. 使用眼藥膏時可能有視線模糊之現象產生，故建議在睡前使用較適宜。

警語：(一)以下情況應停藥立即就醫：

(A) 連續使用三天(或72小時)症狀未解除。

(B) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊、或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

(C) 發生過敏反應。

(D) 青光眼(Glaucoma)患者。

(二)對眼用製劑之主要成分或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。

(三)正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

用法：

需要時使用。將頭往後仰。以一隻手指置於眼睛下之臉頰處，輕輕地向下拉以使眼珠及

下眼瞼形成“V”形的眼袋。擠少量(大約1公分)的Duratears軟膏於“V”形眼袋中。

勿使瓶口接觸眼睛。為避免污染，勿接觸瓶口表面。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

貯藏：貯存於8°C至30°C。將本品置於孩童無法觸及之處。

Alcon
 TAIWAN

製造廠：s.a. Alcon-Couvreur n.v.

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgium

藥商：瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北縣新店市寶中路119號4樓

電話：(02)2917-2468