

PEP 暴露愛滋病毒後 預防性投藥 pep

如有不安全性行為、遭性侵害、共用針器或稀釋液等行為，而有直接接觸到疑似愛滋病毒的血液或體液，經評估後，在72小時內給予預防性投藥，以避免感染。

使用
對象

發生疑似暴露愛滋風險行為者

服藥
方式

暴露後72小時內儘速投藥
並持續28天每日服用

回診
追蹤

抗原/抗體複合型檢驗：暴露後6週、3-4個月
抗體檢驗：暴露後6週、3-4個月、6個月



疾管署PEP
宣導專區



愛滋指定
醫事機構



疾管署PrEP
宣導專區



PrEP 暴露愛滋病毒前 預防性投藥 prep


沒有感染愛滋病毒的人，經評估後，穩定持續服用藥物，讓體內有足夠的藥物濃度來預防可能被病毒感染的風險。

使用
對象

持續有風險行為者且愛滋篩檢為陰性

服藥
方式

1. 每日服用 (daily taken)
2. 依需求時使用 (on-demand) (女性不適用)



還有公費PrEP計畫可以加入喔!

公費計畫：
1. 愛滋感染者的配偶或性伴侶
2. 35歲(含)以下年輕族群



公費計畫名額有限，請有需要且符合上述條件之民眾儘速向合作院所洽詢。